

Aus dem Pharmakologischen Institut  
der Universität Freiburg i. Br.

Zur Kenntniss der Ursachen  
der Kumulierungserscheinungen  
der Digitalisglykoside

Inaugural-Dissertation  
zur Erlangung der Doktorwürde  
einer hohen Medizinischen Fakultät  
der Albert-Ludwigs-Universität zu  
Freiburg i. Br.

Vorgelegt von  
Hellmut Bauer  
aus Lahr i. B.



## Zur Kenntnis der Ursachen der Kumulierungserscheinungen der Digitalisglykoside.

### I. Kumulierungserscheinungen bei der Wertbestimmung an der Katze.

Die Wertbestimmung herzwirksamer Glykoside an der Katze durch langsame intravenöse Infusion verdünnter Lösungen bis zum Eintritt des Herzstillstandes wurde von Hatcher u. Brody eingeführt<sup>1</sup>. Diese Autoren erhielten damals mit Strophanthus und anderen herzwirksamen Glykosiden zweiter Ordnung gut übereinstimmende Werte. Bei Digitalisglykosiden aber fanden sie eine größere Streuung der Einzelversuche und damit Unsicherheit der Ergebnisse. Sie haben deshalb ihre Methodik für die Wertbestimmung der Digitalisglykoside dahin abgeändert, daß sie nur etwa 75% der letalen Dose innerhalb kurzer Zeit (15 Minuten) infundierten, um dann nach 20 Minuten Pause den Versuch durch eine langsame Infusion von Strophanthin zu beenden. Sie glaubten damit den Zweck, schärfer übereinstimmende Werte zu erhalten, erreicht zu haben.

Im Auftrag der Hygienekommission des Völkerbundes hat dann Magnus die Methode von Hatcher u. Brody revidiert und festgestellt, daß man auch mit Digitalisglykosiden genügend übereinstimmende Werte erhalten kann, wenn man die Infusion ohne Unterbrechung langsam bis zum Herzstillstand mit der gleichen Lösung zu Ende führt. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in den Arbeiten von de Lind van Wijngaarden<sup>2</sup> niedergelegt.

Wie allgemein anerkannt, ist die Wertangabe einer für den ärztlichen Gebrauch bestimmten Digitalislösung in Gewichtsmengen eines Standardblättepulvers einer Angabe in Katzen- oder Froscheinheiten vorzuziehen. Der eine von uns hat indessen schon in früheren Arbeiten darauf hin-

---

<sup>1</sup> Hatcher u. Brody: Amer. J. Pharmacy **82**, 360 (1910). — <sup>2</sup> de Lind van Wijngaarden: Arch. f. exper. Path. **113**, 40 (1926); **114**, 21 (1926).

gewiesen<sup>1</sup>, daß diese größere Sicherheit der Angabe in Gewichtsteilen Standardpulver die qualitative Identität der deklarierten wirksamen Substanz mit dem Standard voraussetzt, eine Voraussetzung, die in der Regel nicht erfüllt ist. Es ist deshalb nicht unberechtigt, daß auch Wertangaben in Katzeneinheiten oder Froschdosen beigegeben oder bevorzugt werden.

Differenzen unserer Wertbestimmungen mit Ergebnissen anderer Laboratorien nötigten uns zur Ermittlung eines Fehlers die folgenden Versuche anzustellen:

### 1. Einfluß der Narkose.

Die Digitaliswertbestimmung an der Katze wird von einzelnen Untersuchern in tiefer Narkose durch ein Barbitursäurederivat, von anderen in oberflächlicher Narkose durch Äther oder Lachgas ausgeführt, wobei vielfach bei den letzteren Verfahren während der Infusion die Narkose unterbrochen wird, so daß man den Versuch fast ohne Narkose beendet. Es wurde wiederholt, z. B. auch in der Arbeit von Fromherz u. Welsch festgestellt, daß die Art der Narkose keinen erheblichen Einfluß auf die Ergebnisse hat. Trotzdem haben wir nochmals den Verlauf der Bestimmungen mit Strophanthin und mit Digitoxin einerseits in Numalnarkose und andererseits in leichter Äthernarkose verglichen. Bei den unter Numal ausgeführten Versuchen waren die Tiere dauernd in tiefer Narkose, bei den Versuchen mit Äther wurde eine tiefe Narkose nur für das Einbinden der Kanüle in die Schenkelvene und für den Beginn der Infusion unterhalten, dann wurde nur noch ganz wenig Äther nachgegeben.

Wir fanden in Numalnarkose für reines kristallisiertes g-Strophanthin (Ouabaine Arnaud) die tödliche Dosis 0,114 mg/kg. Dieser Wert ist ein Mittelwert aus acht gut übereinstimmenden Versuchen (tiefster Wert 0,094, höchster Wert 0,128 mg/kg). Der hier gefundene Wert stimmt auch sehr gut überein mit der früher (dieses Archiv 161, 289) angegebenen Versuchsreihe, bei der 0,118 mg/kg als Mittel von sechs Versuchen gefunden wurde.

Wir haben dann mit einer Serie von Katzen dasselbe g-Strophanthin in leichter Äthernarkose ausgewertet und fanden die tödliche Dosis 0,096 mg/kg (tiefster Wert 0,081, höchster Wert 0,121 mg/kg). Wir sehen also, daß man bei der Wertbestimmung des g-Strophanthins in Numalnarkose nahezu 20% höhere letale Dosen findet, als in leichter Äthernarkose.

Analoge Versuche haben wir auch mit Digitoxin ausgeführt. Dabei haben wir nach Magnus bzw. de Lind van Wijngaarden die stark ver-

<sup>1</sup> Fromherz u. Welsch: Arch. f. exper. Path. 161, 266 (1931). — Fromherz: Ebenda 165, 407 (1932).

dünnte Digitoxinlösung in einem Zuge bis zum Herztod ohne Unterbrechung infundiert. Wir finden in Numalnarkose die tödliche Dosis 0,390 mg/kg Digitoxin (tiefster Wert 0,345, höchster Wert 0,441 mg/kg). Dann haben wir denselben Versuch in leichter Äthernarkose ausgeführt und finden als Mittel von sechs Versuchen die letale Dosis 0,403 mg/kg Digitoxin (tiefster Wert 0,326, höchster Wert 0,466 mg/kg). Abgesehen davon, daß die Streuung der Einzelversuche in Numalnarkose etwas geringer war als in Äthernarkose, stimmen die Ergebnisse soweit überein, als man es für eine derartige Wertbestimmung nur wünschen kann. Das Ergebnis stimmt auch praktisch völlig überein mit dem von Fromherz u. Welsch 2 Jahre früher gefundenen: 0,41 mg/kg (dieses Archiv 161, 275). Ein Unterschied der Ergebnisse der Digitaliswertbestimmung an der Katze in Numal- oder andererseits in leichter Äthernarkose ist also nicht festzustellen.

## 2. Einfluß der Unterbrechung der Infusion.

Die beschriebenen Versuche bestätigen, daß man mit der von Magnus und de Lind van Wijngaarden angegebenen modifizierten Hatcher-Methode, die durch ununterbrochene Infusion bis zum Herztod gekennzeichnet ist, völlig konstante Werte erhält. Es wäre nun zu prüfen, ob diese gleichen Werte auch mit der Originalmethode von Hatcher u. Brody gefunden werden. Wir haben deshalb zunächst bei einer Serie von Katzen entsprechend den Angaben von Hatcher u. Brody etwa 75% der letalen Dosis, also nach unserer obigen Feststellung 0,287 mg/kg Digitoxin, langsam infundiert, darauf zunächst ohne Unterbrechung die Infusion mit einer verdünnten Lösung von g-Strophanthin fortgesetzt bis zum Eintritt des Herztodes. Die Versuche wurden zur Hälfte in Numal-, zur Hälfte in leichter Äthernarkose ausgeführt. Unterschiede zwischen diesen Einzelversuchen ergaben sich nicht (s. Tabelle 1).

Tabelle 1. Digitoxin, Infusion nach Hatcher.

Vordose: 0,287 mg/kg Digitoxin infundiert.

Zusatz: Infusion mit g-Strophanthin sofort angeschlossen.

| Katze<br>Nr. | Gewicht<br>in g | Vordose<br>in mg | Zusatzdosis |       |          |
|--------------|-----------------|------------------|-------------|-------|----------|
|              |                 |                  | in cem      | in mg | in mg/kg |
| 1            | 1980            | 0,583            | 3,9         | 0,039 | 0,0195   |
| 2            | 1850            | 0,530            | 2,4         | 0,024 | 0,0130   |
| 3            | 2130            | 0,611            | 3,7         | 0,037 | 0,0170   |
| 4            | 2610            | 0,749            | 5,2         | 0,052 | 0,0200   |
| 5            | 2200            | 0,631            | 0,6         | 0,006 | 0,0023   |
| 6            | 3250            | 0,930            | 7,0         | 0,070 | 0,0215   |
| 7            | 2110            | 0,648            | 9,0         | 0,090 | 0,0426   |

Mittel: 0,0194 mg  
= 18,5 %

So wurde also im Mittel eine Zusatzdosis von 18,5% statt 25% der letalen Dosis g-Strophanthin benötigt. Man findet also nach dieser Methode bereits die letale Dosis des Digitoxins merklich niedriger als nach der Methode von Magnus.

In einer weiteren Versuchsreihe haben wir bei der gleichen Vordosis von 0,287 mg Digitoxin pro Kilogramm die Infusion mit g-Strophanthin erst nach einer Pause von 20 Minuten angeschlossen (s. Tabelle 2).

Tabelle 2.

Vordosis: 0,287 mg/kg Digitoxin infundiert.  
Zusatz: g-Strophanthin nach 20 Minuten Pause.

| Katze<br>Nr. | Gewicht<br>in g | Vordosis<br>in mg | in ccm | Zusatzdosis<br>in mg | in mg/kg            |
|--------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------|---------------------|
| 1            | 2000            | 0,861             | 0,4    | 0,004                | 0,0013              |
| 2            | 2170            | 0,622             | 0*     | 0                    | 0                   |
| 3            | 2130            | 0,613             | 1,5    | 0,015                | 0,007               |
| 4            | 2420            | 0,694             | 0      | 0                    | 0                   |
| 5            | 2850            | 0,817             | 1,9    | 0,019                | 0,0066              |
| 6            | 2320            | 0,665             | 0      | 0                    | 0                   |
| 7            | 2000            | 0,574             | 3,2    | 0,032                | 0,0160              |
| 8            | 2250            | 0,645             | 3,2    | 0,032                | 0,0142              |
| 9            | 2060            | 0,622             | 0      | 0                    | 0                   |
| Mittel:      |                 |                   |        |                      | 0,005 mg<br>= 4,8 % |

\* Ohne Zusatzdosis gestorben.

Hieraus ersehen wir einerseits, daß man bei dieser Abänderung der Methodik die tödliche Dosis des Digitoxins wesentlich niedriger finden würde, da nur noch weniger als 5% statt 25% der tödlichen Dosis g-Strophanthin als Zusatzdosis benötigt wurde. Diese Differenz ist dadurch bedingt, daß ein wesentlicher Teil der Katzen innerhalb der 20 Minuten dauernden Pause bereits spontan, ohne Zusatzdosis, gestorben ist.

Wir müssen also folgern, daß unsere Vordosis mehr als 75% der letalen Dosis war, daß wir uns somit nicht richtig an die Methode von Hatcher u. Brody angepaßt haben. Wir haben deshalb in der dritten Versuchsreihe (s. Tabelle 3) nur 0,2 mg/kg Digitoxin infundiert, dann 20 Minuten gewartet und schließlich die Wertbestimmung durch Infusion von g-Strophanthin bis zum Herztod fortgesetzt.

Die Versuche ergeben im Mittel eine Zusatzdosis von 0,0202 mg g-Strophanthin pro Kilogramm = 19,2% der Dosis letalis. Wir errechnen daraus, daß 0,2 mg Digitoxin 80,8% der letalen Dosis sind. Die letale

Tabelle 3.

Vordose: 0,2 mg/kg Digitoxin infundiert.  
Zusatz: g-Strophanthin nach 20 Minuten Pause.

| Katze<br>Nr. | Gewicht<br>in g | Vordose<br>in mg | in cem | Zusatzdosis<br>in mg | in mg/kg  |
|--------------|-----------------|------------------|--------|----------------------|-----------|
| 1            | 2080            | 0,412            | 13,0   | 0,130                | 0,0630    |
| 2            | 2370            | 0,474            | 2,8    | 0,028                | 0,0119    |
| 3            | 2220            | 0,444            | 7,0    | 0,070                | 0,0319    |
| 4            | 2500            | 0,500            | 1,7    | 0,017                | 0,0068    |
| 5            | 1700            | 0,340            | 0,6    | 0,006                | 0,0035    |
| 6            | 2200            | 0,440            | 0,7    | 0,007                | 0,0031    |
| 7            | 2450            | 0,490            | 6,6    | 0,066                | 0,0269    |
| 8            | 2120            | 0,424            | 4,4    | 0,044                | 0,0207    |
| 9            | 1880            | 0,376            | 3,5    | 0,035                | 0,0186    |
| 10           | 2800            | 0,560            | 4,4    | 0,144                | 0,0156    |
| Mittel:      |                 |                  |        |                      | 0,0202 mg |

Dosis pro Kilogramm (eine Katzendosis) Digitoxin ist also nach der Methodik von Hatcher u. Brody 0,247 mg.

Wir finden demnach mit der Methode von Hatcher u. Brody die letale Dosis um rund 40% niedriger als nach der Methode von Magnus. Hier handelt es sich also nicht um eine kleine Differenz, die der allgemeinen Fehlergrenze solcher Methoden naheläge, sondern um einen sehr wesentlichen Unterschied. Wir müssen aus diesem Befund schließen, daß für die Wertbestimmung der Digitalisglykoside an der Katze eine scharfe Definition der Methode unerlässlich ist. Es ist nach diesem Befund nicht statthaft, von einer Katzendosis schlechthin zu reden, sondern da die Katzendosis nach Hatcher u. Brody wesentlich weniger ist als die nach Magnus, können wir nur von einer Katzendosis nach Hatcher oder einer Katzendosis nach Magnus reden. Es ist dringend erforderlich, daß bei Deklarationen dieser Umstand berücksichtigt wird.

Nachdem durch die Hygienekommission des Völkerbundes speziell die Methode von Magnus empfohlen wurde, wäre zu empfehlen, unter Katzendosis allgemein nur die nach der Technik von Magnus ermittelte Katzendosis zu verstehen.

Die Ursache dieser Differenz der Ergebnisse der beiden Methoden ist der Unterschied der Toxizität des Digitoxins und anderer Digitalisglykoside bei der Infusionsmethode einerseits, bei zeitloser Beobachtung andererseits, also die lange Dauer der vollen Entwicklung der Digitoxinwirkung. Auf diese Befunde soll in der nachfolgenden Arbeit von H. Bauer näher eingegangen werden.

## Zusammenfassung.

1. Der Einfluß der Narkose auf die Ergebnisse der Wertbestimmungsmethode an der Katze ist gering, Strophanthin wird in leichter Äthernarkose etwa 20% wirksamer gefunden als in Numalnarkose. Bei Digitoxin bleibt der Unterschied innerhalb der Fehlergrenze.

2. Durch die Methode der ununterbrochenen Infusion bis zum Herztod nach Magnus findet man Digitoxin und digitoxinhaltige Blätterglykoside wesentlich schwächer wirksam, als wenn man entsprechend der Originalmethode von Hatcher u. Brody die Infusion für die Dauer von 20 Minuten unterbricht und dann mit Strophanthin auffüllt.

3. Der Begriff Katzendosis ist nur in Verbindung mit einer genau festgelegten Methode definiert.

## II. Kritik der Hatterschen Speicherungstheorie und Vergleich der kumulierenden Wirkung verschiedener Digitalisglykoside.

Das Problem der Fixierung der Digitalisglykoside im Herzmuskel, und damit der ersten Schicksale dieser Glykoside im Herzen ist durch eine Reihe wertvoller Arbeiten aus den Instituten von Straub (1) und von Cloetta (2) weitgehend aufgeklärt worden. Die stark oberflächenaktiven Glykoside werden an den Grenzschichten des Muskels adsorbiert. Fischer (3) unterscheidet dabei eine Membranphase, eine Fixationsphase, und eine Wirkungsphase der Digitoxinwirkung am Froschherzen und konnte dieselben Verhältnisse auch in seinen Modellversuchen am Herzmuskel des Hundes wahrscheinlich machen. Die irreversibel gebundene Gesamtmenge Glykosid, die für die nachfolgende Wirkung verantwortlich gemacht werden muß, scheint unter verschiedenen Versuchsbedingungen eine konstante Größe zu sein. Ob aus einer stark verdünnten Lösung in längerer Zeit, oder aus einer konzentrierteren Lösung rascher, immer wird dieselbe Gesamtmenge Glykosid vom Organ irreversibel fixiert. Innerhalb von 24 Stunden läßt sich auch bei größeren Pausen eine additive Fixierung nachweisen. Für den Frosch wie für den Warmblüter gilt, daß das fixierende Organ dem Blut das Glykosid sehr rasch und vollständig entzieht. Unter den Organen, die Glykosid binden, kommt dem Herzmuskel zwar auf Gramm Gewebe bezogen die bedeutendste, aber nicht eine insgesamt quantitativ überwiegende Rolle zu (Weese 4).

Meine Versuche beschäftigen sich im Gegensatz zu diesen primären Schicksalen der Glykoside im Herzen mit den Vorgängen, die sich nach

der Fixation abspielen und die als Ursachen der Kumulierungserscheinungen aufzufassen sind.

Unter Kumulierung versteht man ganz allgemein die Beobachtung, daß innerhalb bestimmter Fristen wiederholte Dosen einer Substanz sich in ihrer Wirkung steigern. Besonders ausgeprägt findet man bei Digitalisglykosiden, daß nach einer ersten Dose innerhalb einer gewissen Zeit eine zweite gleiche Dose stärker wirkt als die erste, oder daß man nach einer ersten schon mit einer kleineren zweiten Dose dieselbe Wirkung erzielt, wie am nicht vorbehandelten Tier mit der ersten. Das kann zunächst in einfachster Weise durch eine Speicherung des Gifts im Herzen erklärt werden. Diese Erklärung hat den Vorteil, daß man dabei die eigentliche Natur der Glykosidwirkung auf sich beruhen lassen kann. Man nimmt dann an, daß die beobachtete Wirkung proportional der im Herzen gebundenen Menge Glykosid ist. So kann man, wie man es von der Narkosetheorie gewohnt ist, Wirkung gleich Giftkonzentration am Wirkungs-orte setzen. Indem man damit den weiteren Rätseln des Wirkungsmechanismus vorläufig aus dem Wege geht und aus den beobachteten Erscheinungen nur auf Giftkonzentration schließt, bedeutet naturgemäß und folgerichtig stärkere Wirkung der zweiten Dose Giftrest im Herzen.

Diese Auffassung stützt sich in erster Linie auf Versuche von Hatcher (5); sie ist auch von diesem Forscher am konsequentesten verwertet worden. Unter dieser Voraussetzung kann man nach Hatcher den im Herzen noch vorhandenen Glykosidrest quantitativ bestimmen, indem man nach einer Vordose zu festgelegten Zeiten die weiteren Glykosidmengen bestimmt, die zur tödlichen Wirkung nötig sind. Diese Menge, von der für das intakte Tier letalen Dose subtrahiert, ergibt den noch im Herzen erhalten gebliebenen Giftrest. Auf diese Weise findet man nach Hatcher ein sehr langsames, ziemlich gleichmäßiges Verschwinden des Digitoxins aus dem Herzen: Noch nach 3 Wochen sind fast 30% der Anfangsdose im Herzen vorhanden.

Indem man bei dieser Auffassung eine Reaktion des Gewebes auf die Anwesenheit des Glykosids überhaupt nicht in den Bereich der theoretischen Erwägungen zieht, hat man es bei der Kumulierung nur mit einfachen physikalischen und chemischen Vorgängen zu tun. Die Kumulierung ist nur die Auswirkung der geringen Geschwindigkeit des Zerfalls des im Herzen fixierten Digitoxins. Da es sich hierbei nur um eine zerfallende Substanz handelt und eine Gegenreaktion, wie bei reversiblen chemischen Vorgängen, nicht anzunehmen ist, muß dieser Zerfall den Bedingungen einer monomolekularen Reaktion entsprechen, d. h. so verlaufen, daß die Giftmenge, die in jedem Moment zerfällt oder ver-

schwindet, der in diesem Moment noch restlich vorhandenen Menge proportional ist.

Von der im Herzen fixierten Anfangsmenge  $a$  ist nach einer bestimmten Zeit  $t$  die (vorläufig unbekannte) Menge  $x$  verschwunden, also noch  $(a-x)$  im Herzen vorhanden. Die Geschwindigkeit des Zerfalls in dem Augenblick nach dem Ablauf der Zeit  $t$  ist demnach proportional  $(a-x)$  oder gleich einer Konstanten  $k$  mal  $(a-x)$ . Die Zerfallsgeschwindigkeit zur Zeit  $t$  ist also:

$$\frac{dx}{dt} = k(a-x). \quad (1)$$

Aus dieser Differentialgleichung berechnet sich durch Integration:

$$t = \frac{1}{k} \ln \frac{a}{a-x}. \quad (2)$$

Haben wir eine Reihe experimentell ermittelter Zahlen, die den Anfangsbestand  $a$  und die Restbestände  $(a-x)$  eines Giftes in einem Organ nach verschiedenen Zeiten  $t$  ausdrücken, dann können wir aus diesen Zahlen nach der Formel (2) für jedes einzelne Wertepaar von  $t$  und  $(a-x)$  die Konstante  $k$  berechnen. Für die von Hatcher gefundenen Zahlen ergibt das folgende Werte:

Tabelle 1.

| $t$ | $(a-x)$ gefunden<br>von Hatcher | $k$ berechnet aus<br>Spalte 1 und 2 | $(a-x)$ berechnet<br>$k=0,0469$ |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 0   | 55                              | —                                   | —                               |
| 1   | 52                              | 0,0561                              | 52,48                           |
| 5   | 46                              | 0,0357                              | 43,48                           |
| 10  | 38                              | 0,0370                              | 34,48                           |
| 20  | 17                              | 0,0587                              | 21,48                           |

Der Mittelwert für  $k$  ist 0,0469. Zu dieser Konstanten müssen wir für die Berechnung der Werte von  $(a-x)$  als zweiten konstanten Wert den der Umrechnung der natürlichen in die Briggschen Logarithmen einrechnen. Die Formel wird dadurch:

$$t = 48,99 \cdot \log \frac{a}{a-x}. \quad (3)$$

Die mit dieser Formel berechneten Werte von  $(a-x)$  enthält die letzte Spalte von Tabelle 1. In Anbetracht der Umstände der Tierversuche ist die Übereinstimmung der beiden Reihen für  $(a-x)$  eine durchaus genügende, um die Hattersche Hypothese als verlässlichen Boden erscheinen zu lassen.

Wir dürfen aber dabei nicht vergessen, daß diese Ermittlung einer Zerfalls- oder Ausscheidungskurve für das zuerst im Herzen fixierte Glykosid rein hypothetisch bleibt, denn es wird immer nur aus der Wirkung einer zweiten Dose auf den noch vorhandenen Rest einer ersten geschlossen, obwohl es noch nicht gelungen ist, diesen Rest auf chemischem Wege zu fassen und als mit dem gegebenen Glykosid qualitativ identisch nachzuweisen. Wir können nicht behaupten, daß ein längeres Erhaltenbleiben von Glykosid im Herzmuskel etwa vom chemischen Standpunkt aus ohne weiteres gegeben wäre. Ganz im Gegenteil muß man darauf hinweisen, daß die Digitalisglykoside, vor allen Dingen, wenn sie nicht in völlig reinem Zustande gelöst vorliegen, recht labile Verbindungen sind. Wie rasch z. B. ein Digitalisinus seine Wirksamkeit verliert, ist bekannt. Nach der Speicherungstheorie der Kumulierungserscheinungen müßten die Glykoside an den Kolloidoberflächen des dauernd stark arbeitenden Herzmuskels adsorbiert angenommen werden, und sollten daselbst zu einem wesentlichen Teil unverändert 3 Wochen lang erhalten bleiben. Das ist eine Vorstellung, die vom biochemischen Standpunkte recht wenig wahrscheinlich ist. Denn an diesen Kolloidoberflächen müssen sich lebhaft chemische Reaktionen abspielen, die den chemischen Abbau der adsorbierten Glykoside zur Folge haben müssen. Dabei weisen die Versuche von Fischer (6) darauf hin, daß die Glykoside schon am ruhenden Herz- oder Skelettmuskel des Hundes rascher zerfallen als der Hatcher'schen Hypothese entspricht. Fischer stellte fest, daß das Digitoxin in Muskelbrei suspendiert und in der Kälte aufbewahrt schon innerhalb von 5—6 Tagen zersetzt bzw. hydrolytisch gespalten ist, obwohl in einem solchen System nur geringe autolytische Prozesse anzunehmen sind. Dieser Zerfall muß also bei der Körpertemperatur des Warmblüters und neben den lebhaften Reaktionen des arbeitenden Muskels noch bedeutend rascher und radikaler vor sich gehen.

Die Speicherungstheorie der Kumulierungserscheinungen, durch die klare und einfache Vorstellungen geschaffen wurden, war von grundlegender Bedeutung für das Verständnis der pharmakologischen Wirkungen und für die Beherrschung der Digitalistherapie. Sie eröffnete als Arbeitshypothese einfache Fragestellungen, die allein geeignet sind, neue Tatsachen ans Licht zu bringen. Theoretische Bedenken, die ihr entgegenstehen, dürfen nicht davon abhalten, die durch die Arbeitshypothese gegebene Richtung experimentell weiter zu verfolgen. Sie mahnen nur, den hypothetischen Charakter solcher Vorstellungen im Auge zu behalten, und nur so weit an ihnen festzuhalten als die gefundenen Tatsachen mit ihnen in Einklang zu bringen sind.

Hatcher gibt in seinen Arbeiten in der Regel keine Einzelversuche sondern nur Mittelwerte seiner Versuchsreihen an. Bei anderen Autoren, die Kumulierungsversuche nach Hatcher ausgeführt haben und ihre ganzen Versuchsreihen angeben, fallen die großen Streuungen der Einzelwerte auf. Dies gilt besonders für die Versuche von Fromherz u. Welsch (7) bei der Bestimmung der Kumulierung des Gitoxins. Solche Streuungen sind geeignet als tatsächliche Bedenken gegen die Speicheringstheorie gewertet zu werden, die schwerer wiegen als die erörterten theoretischen Überlegungen. Eine weitere in diesem Sinne sehr schwer wiegende Tatsache ist die von Fromherz u. Welsch festgestellte Differenz zwischen der bei der Infusion letalen und der zeitlos tödlichen Dose der Digitalisglykoside.

Auf Anregung von Herrn Professor Fromherz begann ich an einem größeren Tiermaterial eine vergleichende Untersuchung über die Kumulierung verschiedener Digitalispräparate. Dabei zeigte sich auch entsprechend obigen Überlegungen bald, daß die Untersuchungen von Hatcher nochmals einer gründlichen und kritischen experimentellen Prüfung unterzogen werden mußten, um eine gesicherte Basis für den Vergleich mit anderen Glykosiden oder Fraktionen zu gewinnen. Deshalb habe ich zunächst eingehende Versuche mit reinem kristallisiertem Digitoxin durchgeführt, das die kumulierende Wirkung am ausgesprochensten und stärksten zeigt.

### Versuchsanordnung.

Durch die Untersuchungen von Fromherz u. Welsch sowie durch die vorstehende Arbeit von Bauer u. Fromherz wurde gezeigt, daß man durch die für die Wertbestimmung ausgearbeiteten Methoden keine festen letalen Dosen für Digitalispräparate erhält, die auch unabhängig von diesen definierten Methoden gelten würden. Entsprechend der vorangehenden Mitteilung wird die insgesamt bis zum Eintritt des Herztodes verbrauchte Glykosidmenge schon wesentlich kleiner, wenn man zwischen der Infusion der Hauptmenge Digitoxin und der Beendigung des Versuchs durch die Infusion von g-Strophanthin eine Pause von 20 Minuten einschaltet. Die Auswirkung der Vordose verstärkt sich also innerhalb dieser 20 Minuten und es war nicht anzunehmen, daß diese Verstärkung mit dieser Frist ihr Ende erreicht hätte. Ich konnte deshalb nicht mit einer festen letalen Dose rechnen, von der nach Hatcher immer 50 oder 60% als Vordose zu geben wären, sondern ich war genötigt, die geeignete Höhe der Vordose zu suchen. Daraus ergab sich, daß ich Versuchsserien mit drei verschiedenen Vordosen ausgeführt habe. Aus jeder

dieser Serien mit bestimmter Vordose injizierter Tiere wurden nach 24, 48, 72 Stunden, 8 und 14 Tagen jeweils Gruppen von Tieren entnommen, und mit g-Strophanthin bis zum Eintritt des Herztods infundiert.

**Präparate.** Zu den Versuchen verwendete ich kristallisiertes Digitoxin, hergestellt von der Firma F. Hoffmann-La Roche A.G. (Basel), ein Präparat von sehr hohem Reinheitsgrad, das in verschiedenen Jahren geprüft, auch immer dieselben biologischen Wirkungswerte ergeben hat. Zu den Auffüllversuchen diente g-Strophanthin, teils kristallisiertes Ouabain-Arnaud (Paris), teils kristallisiertes g-Strophanthin von Merck. Ein Unterschied im Wirkungswert der beiden Präparate war nicht nachweisbar. Als Gitalin-Kraft verwendete ich ein Präparat der Firma Boehringer-Waldhof, das auch Fromherz u. Welsch (7) gebrauchten. Zu den Versuchen mit Digalen diente eine Digalensubstanz der Firma Hoffmann-La Roche von 1932, wie sie zur Herstellung von Handelslösungen verwendet wird.

**Vordose:** Die Vordosen wurden nach Einbinden einer Kanüle in leichter Äthernarkose langsam innerhalb von 15 Minuten in die V. saphena infundiert. Dazu wurde das Digitoxin 1 : 50000 in Kochsalzlösung mit 10% Alkohol gelöst. Aus dieser Lösung kristallisiert das Digitoxin innerhalb der erforderlichen Zeit sicher nicht aus. Gitalin-Kraft und Digalen wurden mit Hilfe von wenig Alkohol 1 : 25000 in Kochsalzlösung gelöst infundiert.

**Zusatzdosen:** Zum Zwecke der zweiten Infusion (Zusatz- oder Auffüll-dose) wurde wieder in leichter Äthernarkose eine Kanüle in die Saphena eingebunden. Zur Infusion diente eine Lösung von g-Strophanthin 1 : 100000 in Kochsalzlösung, hergestellt mit wenig Alkohol. Um etwaige Fehler durch teilweises Auskristallisieren zu vermeiden, wurden diese Lösungen immer frisch hergestellt. Während der Infusion wurde die Äthernarkose nicht fortgesetzt. Die Infusionsgeschwindigkeit wurde auf etwa 0,3—0,4 cem pro Kilogramm und Minute reguliert.

Die Beobachtung dieser Versuche erfolgte in der von Fromherz u. Welsch (7) beschriebenen Weise: Die Herzaktion wurde auskultatorisch verfolgt. Es gelingt so am besten, die Vorboten des Herzstillstandes zu erkennen. Als Endreaktion wurde der erste Herzstillstand angenommen. Oft beginnt darauf das Herz nochmals in einzelnen Serien von raschen Schlagfolgen von neuem zu arbeiten; eine Erholung nach Abstellung der Infusion tritt dabei aber nie ein.

Bei solchen Versuchen findet man immer wieder, wie auch von de Lind van Wijngaarden beschrieben, einzelne Tiere, die mit abnorm hoher oder abnorm geringer Glykosidempfindlichkeit aus der Reihe fallen. Im allgemeinen ist diese Empfindlichkeit aber eine recht gleichmäßige, so daß diese Ausnahmen das Gesamtbild der Ergebnisse nicht beeinflussen können.

Zwischen Vordose und Zusatzdose wurden die Tiere im Stall gehalten und täglich, bei Vergiftungserscheinungen mehrmals täglich auf Allgemeinzustand und Herztätigkeit untersucht. Nach Abschluß der Versuche wurde bei der in jedem Falle durchgeführten Sektion besonders auf den Zustand der Respirationsorgane, der Nieren und des Uterus geachtet. Versuche, bei denen die Sektion pneumonische oder nephritische Erscheinungen oder eine Gravidität ergab, wurden gestrichen.

Die Berechnung der Zusatzdosen erfolgte auf das Endgewicht der Tiere. Gold (8) hat seine Werte aus dem Mittel von Anfang- und Endgewicht berechnet. Eine zwingende experimentelle Begründung für die eine oder die andere Art der Berechnung besteht nicht. Die Vordose bewirkt nicht nur mehr oder weniger schwere Herzscheidigungen, sondern auch Wasserverluste. Durch das Erbrechen und die Störung der Freßlust der Tiere, besonders in den ersten Tagen der Vergiftung, müssen die Tiere in einen mehr oder minder schweren Durst- und Inanitionszustand geraten. Die Folge davon ist, daß am Ende der Versuche bei der Sektion der Magen-Darmkanal in der Regel leer befunden wird. Vor allem ist dann der Dickdarm leer, während zu Beginn der Versuche, trotzdem die Tiere zuvor über Nacht hungerten, der Dickdarm in den meisten Fällen nicht zu vernachlässigende Gewichte von Kot enthält. Diese Überlegungen ließen sich für das Verfahren von Gold verwerten. Ich habe indessen vorgezogen, die Ergebnisse aus dem Endgewicht zu berechnen, um der direkten Beobachtung näher zu bleiben, zumal in den meisten Fällen der Unterschied der beiden Berechnungsarten bei einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 100—200 g oder weniger als 10% nur recht gering wäre. Eine Entscheidung darüber, welche der beiden Arten der Berechnung richtiger ist, ließe sich nur dadurch treffen, daß man für frische und vorbehandelte Tiere nach dem Verfahren von Weese den Anteil des extrakardial gebundenen Glykosids bestimmen würde.

### Ergebnisse.

#### A. Digitoxin.

##### I. Kumulierungsversuche nach Hatcher.

Langfristige Kumulierungsversuche nach der Auffüllmethode von Hatcher mit der in der vorstehenden Mitteilung von Bauer u. Fromherz verwendeten Vordose von 0,2 mg Digitoxin pro Kilogramm oder 50% der bei der einmaligen Infusion nach der Methode von Magnus eben letalen Dose erwiesen sich rasch als unmöglich. Es bestätigte sich der Befund von Fromherz u. Welsch (7), daß nach dieser Dose schon innerhalb von 24 Stunden 65% der injizierten Tiere sterben, und daß auch ohne Zusatzdose keines dieser Tiere dem Herztod entgeht. Beobachtet man Tiere nach der Infusion von 0,2 mg pro Kilogramm Digitoxin, dann findet man sie in den ersten Tagen, soweit sie nicht früher sterben, in äußerst elendem Zustand. Sie liegen matt und teilnahmslos, meistens in Seitenlage, mit vertiefter und frequenter Atmung da und beachten keine Nahrung. Auch Versuche, sie durch die Schlundsonde zu ernähren, bleiben wegen des unstillbaren Erbrechens meistens erfolglos. Nur durch subkutane Kochsalzinfusion kann man den Wasserverlust der Tiere bekämpfen. Auch das nützt bei vielen dieser Katzen nichts mehr und sie sterben zuletzt in einer Art von Koma. Bisweilen erholt sich ein Tier auch etwas und beginnt dann nach 2—4 Tagen wieder zu fressen. Aber auch diese Tiere sterben in der Regel plötzlich aus scheinbarem Wohlbefinden.

Eine Dose von 0,2 mg/kg Digitoxin ist also für die Katze praktisch immer tödlich, nur variiert die Zeit bis zum Eintritt des Todes zwischen  $\frac{1}{2}$  Stunde und etwa 14 Tagen. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, die Vordose für die Kumulierungsversuche weiter herabzusetzen. Ich verfüge über drei Versuchsreihen mit 0,1, 0,14 und 0,17 mg Digitoxin pro Kilogramm als Vordosen, deren Verlauf in den Tabellen 2—4 wiedergegeben ist. Diese Versuche sind durchweg entsprechend der Anordnung von Hatcher ausgeführt, nur muß darauf verzichtet werden, die Vordose in Prozent der letalen Dose auszudrücken. Dagegen können wir wohl die Zusatzdose g-Strophanthin, die zur letalen Wirkung erforderlich war, in Prozent der für das intakte Tier letalen Dose ausdrücken. Diese Zahl von 100 subtrahiert gibt nach Hatcher ein Maß für den am Ende des Versuchs noch im Herzen vorhandenen Rest der Vordose.

Überblickt man die in den Tabellen 2—4 zusammengestellten Versuche mit Digitoxin an etwa 130 Katzen, um aus denselben ein Urteil

Tabelle 2. Kumulierungsversuche nach Hatcher mit Vordosen von 0,10 mg Digitoxin pro Kilogramm.

| Tier<br>Nr. | Katzen-Gewichte bei der |                      | Beendigung der<br>Versuche<br>nach Zeit | Zusatzdose g-Strophanthin |                           |
|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             | I. Infusion<br>in g     | II. Infusion<br>in g |                                         | in mg<br>pro Kilogramm    | in %<br>der Dosis letalis |
| 1           | 2570                    | —                    | 24 Stunden                              | ohne Zusatzdose gestorben |                           |
| 2           | 1600                    | 1500                 | 24 Stunden                              | 0,0693                    | 73                        |
| 3           | 1620                    | 1500                 |                                         | 0,1010                    | 105                       |
| 4           | 1570                    | 1500                 |                                         | 0,0873                    | 91                        |
| 5           | 2580                    | 2400                 |                                         | 0,0795                    | 83                        |
| 6           | 2320                    | 2190                 |                                         | 0,0876                    | 91                        |
| 7           | 2320                    | 2240                 |                                         | 0,0928                    | 96                        |
| Mittel:     |                         |                      |                                         | 0,0862                    | 90 %                      |
| 8           | 2470                    | 2050                 | 48 Stunden                              | 0,0593                    | 63                        |
| 9           | 2400                    | 2080                 |                                         | 0,0831                    | 87                        |
| 10          | 2380                    | 2170                 |                                         | 0,1087                    | 112                       |
| 11          | 2380                    | 2180                 |                                         | 0,0926                    | 96                        |
| 12          | 3960                    | 4050                 |                                         | 0,1049                    | 108                       |
| 13          | 2000                    | 1780                 |                                         | 0,1118                    | 115                       |
| Mittel:     |                         |                      |                                         | 0,0934                    | 97 %                      |
| 14          | 2100                    | 1800                 | 72 Stunden                              | 0,1016                    | 105                       |
| 15          | 2760                    | 2460                 |                                         | 0,1080                    | 112                       |
| Mittel:     |                         |                      |                                         | 0,1048                    | 108 %                     |
| 16          | 1790                    | 1800                 | 14 Tage                                 | 0,0930                    | 97                        |
| 17          | 2480                    | 2200                 |                                         | 0,1085                    | 112                       |
| Mittel:     |                         |                      |                                         | 0,1002                    | 104 %                     |

Tabelle 3. Kumulierungsversuche nach Hatcher mit Vordosen von 0,14 mg Digitoxin pro Kilogramm.

| Tier<br>Nr. | Katzen-Gewichte bei der |                      | Beendigung der<br>Versuche<br>nach Zeit | Zusatzdosis g-Strophanthin    |                           |
|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|             | I. Infusion<br>in g     | II. Infusion<br>in g |                                         | in mg<br>pro Kilogramm        | in %<br>der Dosis letalis |
| 1           | 2540                    | —                    | 20 Minuten                              | ohne Zusatzdosis<br>gestorben |                           |
| 2           | 2040                    | —                    | 42 Minuten                              |                               |                           |
| 3           | 2580                    | —                    | 24 Stunden                              |                               |                           |
| 4           | 2570                    | —                    |                                         |                               |                           |
| 5           | 2120                    | —                    |                                         |                               |                           |
| 6           | 1900                    | —                    |                                         |                               |                           |
| 7           | 3100                    | —                    |                                         |                               |                           |
| 8           | 2320                    | —                    | 20 Minuten                              | 0,0504                        | 52                        |
| 9           | 1900                    | —                    |                                         | 0,0516                        | 53                        |
| 10          | 1660                    | —                    |                                         | 0,0854                        | 89                        |
| 11          | 2240                    | —                    |                                         | 0,0741                        | 77                        |
| 12          | 1920                    | —                    |                                         | 0,0701                        | 73                        |
| Mittel:     |                         |                      |                                         | 0,0663                        | 69 %                      |
| 13          | 1800                    | 1700                 | 24 Stunden                              | 0,0835                        | 87                        |
| 14          | 2100                    | 2000                 |                                         | 0,0570                        | 60                        |
| 15          | 2530                    | 2400                 |                                         | 0,0350                        | 37                        |
| 16          | 2000                    | 1900                 |                                         | 0,0531                        | 55                        |
| 17          | 1680                    | 1625                 |                                         | 0,0443                        | 46                        |
| 18          | 2340                    | 2250                 |                                         | 0,1007                        | 104                       |
| 19          | 2070                    | 1850                 |                                         | 0,0803                        | 84                        |
| 20          | 2180                    | 2060                 |                                         | 0,0747                        | 77                        |
| Mittel:     |                         |                      |                                         | 0,0660                        | 69 %                      |
| 21          | 2820                    | —                    | 48 Stunden                              | ohne Zusatzdosis gestorben    |                           |
| 22          | 2750                    | 2460                 | 48 Stunden                              | 0,0752                        | 78                        |
| 23          | 2900                    | 2700                 |                                         | 0,0803                        | 84                        |
| 24          | 1640                    | 1570                 |                                         | 0,0757                        | 78                        |
| 25          | 1930                    | 1800                 |                                         | 0,0766                        | 80                        |
| 26          | 1990                    | 1690                 |                                         | 0,0831                        | 87                        |
| 27          | 2350                    | 2240                 |                                         | 0,0781                        | 82                        |
| 28          | 2000                    | 1760                 |                                         | 0,1127                        | 116                       |
| Mittel:     |                         |                      |                                         | 0,0831                        | 87 %                      |
| 29          | 2420                    | —                    | 72 Stunden                              | ohne Zusatzdosis gestorben    |                           |
| 30          | 2000                    | 1680                 | 72 Stunden                              | 0,0535                        | 55                        |
| 31          | 2240                    | 1940                 |                                         | 0,0871                        | 91                        |
| 32          | 2600                    | 2150                 |                                         | 0,0563                        | 58                        |
| 33          | 2530                    | 2260                 |                                         | 0,0915                        | 95                        |
| 34          | 2140                    | 1950                 |                                         | 0,0831                        | 87                        |
| 35          | 2150                    | 1950                 |                                         | 0,0794                        | 83                        |
| 36          | 2000                    | 1870                 |                                         | 0,0743                        | 77                        |
| 37          | 1970                    | 1650                 |                                         | 0,0465                        | 48                        |
| Mittel:     |                         |                      |                                         | 0,0714                        | 74 %                      |
| 38          | 1970                    | —                    | 5 Tage                                  | ohne Zusatzdosis<br>gestorben |                           |
| 39          | 2260                    | —                    | 6 Tage                                  |                               |                           |
| 40          | 2830                    | —                    | 7 Tage                                  |                               |                           |
| 41          | 2480                    | —                    | 8 Tage                                  |                               |                           |

Fortsetzung von Tabelle 3. Kumulierungsversuche nach Hatcher mit Vordosen von 0,14 mg Digitoxin pro Kilogramm.

| Tier<br>Nr. | Katzen-Gewichte bei der |                      | Beendigung der<br>Versuche<br>nach Zeit | Zusatzdosis g-Strophanthin |                           |
|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|             | I. Infusion<br>in g     | II. Infusion<br>in g |                                         | in mg<br>pro Kilogramm     | in %<br>der Dosis letalis |
| 42          | 2370                    | 2190                 | } 8 Tage }                              | 0,0885                     | 92                        |
| 43          | 2250                    | 1820                 |                                         | 0,0576                     | 60                        |
| 44          | 2050                    | 1580                 |                                         | 0,1020                     | 106                       |
| 45          | 2370                    | 2200                 |                                         | 0,1049                     | 108                       |
| Mittel:     |                         |                      |                                         | 0,0882                     | 92 %                      |
| 46          | 3150                    | —                    | 9 Tage                                  | ohne Zusatzdosis gestorben |                           |
| 47          | 3050                    | 2990                 | } 14 Tage }                             | 0,0946                     | 98                        |
| 48          | 3110                    | 3010                 |                                         | 0,0937                     | 97                        |
| 49          | 2100                    | 1550                 |                                         | 0,0587                     | 61                        |
| 50          | 2650                    | 2300                 |                                         | 0,1130                     | 117                       |
| 51          | 2670                    | 2250                 |                                         | 0,0822                     | 86                        |
| 52          | 1670                    | 1280                 |                                         | 0,0937                     | 97                        |
| Mittel:     |                         |                      |                                         | 0,0893                     | 94 %                      |

über die Speicherungstheorie der Kumulierung (vgl. Tabelle 1) zu gewinnen, dann finden wir in drei Richtungen Unstimmigkeiten, die aber in ihrem Wesen zusammenhängen. Das sind 1. die spontanen Todesfälle, 2. die Streuungen und 3. die Höhe der Zusatzdosen.

### 1. Die Streuungen der Zusatzdosen.

Die Streuung der Einzelwerte der gefundenen Zusatzdosen würde uns zwingen, die einzelnen Punkte der Hatterschen Kumulierungskurve (s. Tabelle 1) durch Mittelwertberechnungen zu ermitteln. Dabei ist man zunächst im Zweifel, inwieweit man berechtigt ist, die spontan ohne Zusatzdosis gestorbenen Tiere unberücksichtigt zu lassen. Dazu wären wir eigentlich nur dann berechtigt, wenn diese Tiere interkurrent gestorben wären und wenn durch einen klinischen Befund und die Sektion nachgewiesen wäre, daß sie nicht der Digitoxinvergiftung sondern einer Pneumonie oder einer anderen Infektion erlegen sind. Alle Tiere der Versuchsreihen sind sorgfältig beobachtet; nachweislich interkurrent gestorbene sind bereits ausgeschieden und nicht in die Tabellen aufgenommen. Umgekehrt sind die in den Tabellen als „ohne Zusatzdosis gestorben“ aufgeführten Tiere ohne Zeichen einer Infektion aber mit klaren Symptomen der Digitalisvergiftung des Herzens eingegangen, wie durch die Beobachtung der Herztätigkeit und des Allgemeinzustandes (vgl. unten S. 713) sowie durch eine sorgfältige Sektion erwiesen wurde. Wir können deshalb diese Tiere für die Betrachtung des gesamten Kumulierungsproblems nicht außer acht lassen. Wir müssen vielmehr für sie als nach-

Tabelle 4. Kumulierungsversuche nach Hatcher mit Vordosen von 0,17 mg Digitoxin pro Kilogramm.

| Tier<br>Nr. | Katzen-Gewichte bei der |                      | Beendigung der<br>Versuche<br>nach Zeit | Zusatzdosis g-Strophanthin      |                           |
|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|             | I. Infusion<br>in g     | II. Infusion<br>in g |                                         | in mg<br>pro Kilogramm          | in %<br>der Dosis letalis |
| 1           | 2020                    | —                    | 40 Minuten                              | } ohne Zusatzdosis<br>gestorben |                           |
| 2           | 2300                    | —                    | 45 Minuten                              |                                 |                           |
| 3           | 3220                    | —                    | 12 Stunden                              |                                 |                           |
| 4           | 3050                    | —                    | 20 Stunden                              |                                 |                           |
| 5           | 2060                    | —                    | 24 Stunden                              |                                 |                           |
| 6           | 2380                    | 2280                 | } 24 Stunden                            | 0,0644                          | 67                        |
| 7           | 2080                    | 1950                 |                                         | 0,0403                          | 42                        |
| 8           | 2680                    | 2450                 |                                         | 0,0567                          | 58                        |
| 9           | 2390                    | 2290                 |                                         | 0,0441                          | 46                        |
| 10          | 4700                    | 4350                 |                                         | 0,0344                          | 36                        |
| 11          | 2440                    | 2300                 |                                         | 0,0630                          | 66                        |
| 12          | 2510                    | 2410                 |                                         | 0,0419                          | 43                        |
| 13          | 2110                    | 1950                 |                                         | 0,0852                          | 89                        |
| 14          | 2630                    | 2340                 |                                         | 0,0696                          | 72                        |
| 15          | 2520                    | 2300                 |                                         | 0,0765                          | 80                        |
| Mittel:     |                         |                      |                                         | 0,0576                          | 60 %                      |
| 16          | 2460                    | —                    | 30 Stunden                              | } ohne Zusatzdosis<br>gestorben |                           |
| 17          | 2450                    | —                    | 35 Stunden                              |                                 |                           |
| 18          | 2600                    | —                    | 36 Stunden                              |                                 |                           |
| 19          | 2340                    | —                    | 48 Stunden                              |                                 |                           |
| 20          | 2670                    | 2470                 | } 48 Stunden                            | 0,0736                          | 76                        |
| 21          | 3100                    | 2920                 |                                         | 0,0737                          | 76                        |
| 22          | 3270                    | 2860                 |                                         | 0,1031                          | 107                       |
| 23          | 2260                    | 2090                 |                                         | 0,0650                          | 68                        |
| 24          | 2390                    | 2130                 |                                         | 0,0816                          | 85                        |
| 25          | 2110                    | 1850                 |                                         | 0,1032                          | 107                       |
| 26          | 2190                    | 1900                 |                                         | 0,0636                          | 66                        |
| Mittel:     |                         |                      |                                         | 0,0805                          | 84 %                      |
| 27          | 1750                    | —                    | 72 Stunden                              | ohne Zusatzdosis gestorben      |                           |
| 28          | 1840                    | 1710                 | } 72 Stunden                            | 0,1005                          | 104                       |
| 29          | 2520                    | 2270                 |                                         | 0,0740                          | 77                        |
| 30          | 2790                    | 2350                 |                                         | 0,0944                          | 98                        |
| 31          | 2100                    | 1840                 |                                         | 0,0701                          | 73                        |
| 32          | 1950                    | 1600                 |                                         | 0,0825                          | 86                        |
| 33          | 2470                    | 2190                 |                                         | 0,0575                          | 59                        |
| Mittel:     |                         |                      |                                         | 0,0798                          | 83 %                      |
| 34          | 3150                    | 2620                 | } 8 Tage                                | 0,1137                          | 117                       |
| 35          | 2290                    | 1870                 |                                         | 0,0973                          | 101                       |
| Mittel:     |                         |                      |                                         | 0,1055                          | 109 %                     |
| 36          | 2760                    | —                    | 11 Tage                                 | } ohne Zusatzdosis<br>gestorben |                           |
| 37          | 2230                    | —                    | 12 Tage                                 |                                 |                           |
| 38          | 2910                    | 2350                 | 14 Tage                                 | 0,0868                          | 90                        |

gewiesen betrachten, daß hier die Vordose allein schon im Laufe von Tagen tödlich war und müssen feststellen, daß man bei diesen Tieren von einem Verschwinden des Giftes aus dem Herzen überhaupt nicht reden kann.

Scheiden wir diese Tiere aus der Mittelwertsberechnung aus, dann bleiben immer noch sehr beträchtliche Streuungen bestehen, die über die Streuung, die man bei der einfachen Bestimmung einer letalen Dose eines Glykosids mit intakten Tieren findet, weit hinausgehen. Wir sehen bei diesen Auffüllversuchen neben den spontanen Todesfällen noch einerseits Tiere, die mit verhältnismäßig kleinen Zusatzdosen sterben und die vielleicht in einigen Tagen ebenfalls spontan erlegen wären, daneben Tiere, die nahezu die volle Zusatzdosis brauchen.

Bei dieser Lage der Einzelwerte erscheint es also fraglich, ob wir überhaupt berechtigt sind, solche Werte durch Mittelwertsberechnungen zusammenzufassen. Mittelwerte werden bei verschiedenartigsten naturwissenschaftlichen Untersuchungen in Rechnung gestellt. Sollen sie aber nicht das Wesentliche einer Gruppe von Einzelbeobachtungen verschleiern, dann muß vorausgesetzt werden, daß es sich nur um gleichartige Einzelbeobachtungen handelt, die in dieser Weise zusammengefaßt werden. Das typische Beispiel einer berechtigten Mittelwertbestimmung ist die Verwertung von Ablesungen eines oder mehrerer Untersucher an einem physikalischen Instrument. Solche Beobachtungen zeigen auch das Charakteristische, daß sie um einen Mittelwert herum gruppiert sind und daß ihre Häufigkeit in der Nähe des Mittelwerts ein Maximum hat. In unserem Falle dagegen haben wir ein ganz anderes Verhalten: Die Werte liegen eher in zwei Gruppen auseinander, wovon die eine nach der Zusatzdosis 0 (Spontanodesfälle), die andere aber nach der vollen Zusatzdosis konvergiert. Unter den durch Auffüllen mit Strophanthin beendeten Versuchen überwiegt die letztere Gruppe zahlenmäßig ausgesprochen.

Diese Feststellung spricht nicht dafür, daß wir hier durch eine Mittelwertsberechnung, mit der wir recht divergente Einzelwerte zusammenfassen, ein richtiges Bild von dem Wesen des der Kumulierung zugrunde liegenden Vorgangs erhalten. Wir können nicht sagen, daß dieser Mittelwert dem charakteristischen Verlauf der Versuche entspricht. Eher gewinnen wir den Eindruck, daß wir mit einer solchen Mittelwertsberechnung die Tatsachen vergewaltigen und damit nur die Beobachtung verschleiern, daß wir zwei Gruppen von Tieren zu unterscheiden haben, von denen die eine größtenteils irreversibel durch die Digitoxinvergiftung geschädigt ist, während die andere innerhalb relativ kurzer Zeit diese Vergiftung völlig überwunden hat.

Wir müssen damit feststellen, daß weder die eine noch die andere Gruppe von Tieren sich so verhält, wie es die Hatcher'sche Speicherungstheorie (vgl. Tabelle 1) verlangt, und wir ziehen daraus den Schluß, daß die dieser entsprechende Kurve des Verschwindens des Digitoxins aus dem Herzen keine allgemeine Gültigkeit haben kann.

## 2. Tödliche Wirkung bei zeitloser Beobachtung.

Der Umstand, daß nach 0,14 und 0,17 mg Digitoxin pro Kilogramm ein wesentlicher Teil der Katzen vor allem in den ersten Tagen nach der ersten Injektion ohne Zusatzdose stirbt, ist nur ein extremer Fall der großen Streuung der Höhe der Zusatzdose, die wir besprochen haben. Der Umfang des Vorkommens solcher Spättodesfälle ohne Zusatzdose läßt sich aus den Tabellen 3 und 4 nicht ohne weiteres übersehen, weil wir aus der gesamten Zahl der mit der gleichen Vordose infundierten Tiere immer wieder einzelne Gruppen von Tieren entnommen haben, um die Zusatzdose zu bestimmen. Wir müssen deshalb diese Entnahmen berücksichtigen, wenn wir die Todesfälle in Prozent der ursprünglich injizierten Tiere berechnen wollen. Dies ist in den Tabellen 3a und 4a geschehen, die am besten dann verständlich werden, wenn man die einzelnen horizontalen Reihen von links nach rechts liest, wobei sich jeweils die folgende

Tabelle 3a. Versuchsreihe von Tabelle 3. Ohne Zusatzdose gestorbene Tiere. Vordose: 0,14 mg Digitoxin pro Kilogramm. Reihe von 52 Katzen.

| Nach Zeit  | lebend | Zum Zweck<br>des Auffüll-<br>versuches aus<br>der Reihe<br>entnommen | Rest | In der folgenden Periode ohne Zusatzdose<br>gestorben |                                                                          |      |                   |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
|            |        |                                                                      |      | vom noch<br>vorhandenen<br>Bestand                    | Berechnet auf die Gesamtzahl<br>für die<br>einzelnen<br>Perioden<br>in % | Zahl | insgesamt<br>in % |
| 1 Stunde   | 52     | 5                                                                    | 47   | 3                                                     | 3,3                                                                      | 6,3  | 6,3               |
| 24 Stunden | 44     | 8                                                                    | 36   | 4                                                     | 5,4                                                                      | 10,4 | 16,7              |
| 48 „       | 32     | 7                                                                    | 25   | 1                                                     | 1,7                                                                      | 3,3  | 20,0              |
| 72 „       | 24     | 8                                                                    | 16   | 1                                                     | 2,5                                                                      | 4,7  | 24,7              |
| 5 Tage     | 15     | —                                                                    | 15   | 1                                                     | 2,5                                                                      | 4,7  | 29,4              |
| 6 „        | 14     | —                                                                    | 14   | 1                                                     | 2,6                                                                      | 5,0  | 34,4              |
| 7 „        | 13     | —                                                                    | 13   | 1                                                     | 2,6                                                                      | 5,0  | 39,4              |
| 8 „        | 12     | 4                                                                    | 8    | 1                                                     | 3,7                                                                      | 7,2  | 46,6              |
| 9 „        | 7      | —                                                                    | 7    | 1                                                     | 3,9                                                                      | 7,5  | 54,1              |
| 14 „       | 6      | 6                                                                    | 0    | —                                                     | —                                                                        | —    | 54,1              |

Innerhalb von 14 Tagen sind also aus der ganzen Reihe insgesamt 54,1% der infundierten Katzen ohne Zusatzdose gestorben.

Tabelle 4a. Versuchsreihe von Tabelle 4. Ohne Zusatzdose gestorbene Tiere.  
Vordose: 0,17 mg Digitoxin pro Kilogramm. Reihe von 38 Katzen.

| Nach Zeit  | lebend | Zum Zweck<br>des Ausfüll-<br>versuches aus<br>der Reihe<br>entnommen | Rest | In der folgenden Periode ohne Zusatzdose<br>gestorben |                           |                                          |                                 |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|            |        |                                                                      |      | vom noch<br>vorhandenen<br>Bestand                    | Berechnet auf die<br>Zahl | für die<br>einzelnen<br>Perioden<br>in % | Gesamtzahl<br>insgesamt<br>in % |
| Beginn:    | 38     | 0                                                                    | 38   | 4                                                     | 4                         | 10,6                                     | 10,6                            |
| 24 Stunden | 34     | 10                                                                   | 24   | 4                                                     | 5,6                       | 14,7                                     | 25,3                            |
| 48 „       | 20     | 7                                                                    | 13   | 1                                                     | 2,1                       | 5,5                                      | 30,8                            |
| 72 „       | 12     | 6                                                                    | 6    | 1                                                     | 4,3                       | 11,5                                     | 42,3                            |
| 8 Tage     | 5      | 2                                                                    | 3    | —                                                     | —                         | —                                        | 42,3                            |
| 11 „       | 3      | —                                                                    | 3    | 1                                                     | 7,3                       | 19,2                                     | 61,5                            |
| 12 „       | 2      | —                                                                    | 2    | 1                                                     | 7,3                       | 19,2                                     | 80,7                            |
| 14 „       | 1      | 1                                                                    | 0    | —                                                     | —                         | —                                        | 80,7                            |

Innerhalb von 14 Tagen wären also aus der ganzen Reihe insgesamt 80,7% der infundierten Katzen ohne Zusatzdose gestorben.

Zahl aus den vorhergehenden ergibt. Die erste Zahl der folgenden Reihe ergibt sich dann aus der Zahl der 4. und 5. Spalte der vorhergehenden Reihe. Die letzte Spalte der beiden Tabellen gibt uns dann an, wie viele von 100 mit der gleichen Vordose injizierten Tiere nach bestimmten Zeiten ohne Zusatzdose gestorben sind.

Nach einer Vordose von 0,10 mg pro Kilogramm Digitoxin ist von 17 Tieren nur ein einziges ohne Zusatzdose gestorben (Tabelle 2). Wir können also annehmen, daß diese Dose praktisch in jedem Falle bei zeitloser Beobachtung ertragen wird.

Bei einer Vordose von 0,14 mg Digitoxin pro Kilogramm aber sind innerhalb von 14 Tagen 54% der Tiere spontan gestorben. Die Todesfälle verteilen sich auf die Zeit von 14 Tagen so, daß innerhalb der ersten 5 Tage mehr als die Hälfte der insgesamt eingegangenen Tiere erlegen ist, während in den folgenden Tagen die Sterblichkeit langsam abnahm.

Bei einer Vordose von 0,17 mg/kg stirbt noch eine wesentlich größere Zahl der injizierten Tiere ohne Zusatzdose. Schon innerhalb von 3 Tagen sind über 40% der infundierten Tiere ohne Zusatzdose eingegangen und nach 14 Tagen überleben kaum mehr 20%. Wenn auch für diese letzten Tage nur noch wenige Tiere übrig waren, ein Fehler also durch die Berechnung stark vergrößert würde, so können wir uns auch darauf beziehen, daß nach 0,2 mg/kg kein Tier überlebte, so daß wir sicher nicht fehl gehen, wenn wir sagen, daß die Dose von 0,17 mg/kg bei zeitloser Beobachtung für weitaus die Mehrzahl der Tiere allein schon letal ist.

Vergleichen wir diese Feststellungen mit den Angaben von Hatcher, dann dürfen wir nicht die nach dem Verfahren von Magnus gefundene (0,40 mg Digitoxin pro Kilogramm), sondern wir müssen die nach der Methode von Hatcher u. Brody festgestellte letale Dose (0,247 mg/kg)<sup>1</sup> zugrunde legen. Diese Dose stimmt ja auch mit den Angaben von Hatcher selbst (0,3 mg Digitoxin = 1 Katzendose) besser überein. Unsere Dose von 0,17 mg/kg wäre dann 69% der nach Hatcher letalen Dose.

Straub gibt an, daß bei Vermeidung jeglicher Anstrengung 80% der letalen Dose von den Katzen ertragen würde. Es besteht also hier ein Widerspruch in dem Beobachtungsmaterial, für den wir ohne weiteres keine Erklärung haben. In der Gegenüberstellung von Anstrengung und Ruhe kann ich kaum den Punkt sehen, in dem unsere Versuche von denen anderer Autoren differieren sollen. Nach diesen beträchtlichen Dosen vermeiden die Tiere schon von sich aus jede Anstrengung. Sie liegen oft tagelang ruhig im Käfig, soweit nicht die Brechwirkung des Glykosids im Vordergrund der Erscheinungen steht, wie es sehr häufig der Fall ist. Dieses oft unstillbare Erbrechen bedeutet zweifellos eine schwere, obwohl nicht von außen bedingte Anstrengung und damit auch eine Belastung des Herzens. Nach Hatcher ist die Pflege der Tiere für das Überstehen der großen Dosen maßgebend. Auch ich habe meine Tiere bestmöglichst gepflegt und überwacht. Die Pflege hat aber im wesentlichen die Bekämpfung der Brechwirkung zu berücksichtigen: Die Tiere verweigern in der Regel jede Nahrungsaufnahme oder erbrechen alles, was sie aufgenommen haben. Selbst vorsichtig mit der Schlundsonde eingegebene warme Milch wird häufig wieder erbrochen. Auch bei leerem Magen erbrechen die Tiere oft eine Menge gallig gefärbten Schleims, so daß man mit einem erheblichen Flüssigkeitsverlust rechnen muß, dessen Folgen man nur durch subkutane Kochsalzinfusionen bekämpfen kann.

Parallel mit diesen schweren Störungen der Magenfunktion beobachtet man ausgesprochene Herzsymptome als Zeichen der Digitalisvergiftung. Die Herzaktion ist meist verlangsamt und arhythmisch. Häufig sieht man auch Rhythmuswechsel. Diese Störungen kann man auch elektrokardiographisch nachweisen und beobachtet typische Veränderungen als Zeichen muskulärer Störungen, insbesondere Umkehr der T-Zacke, Rhythmusstörungen, ähnlich wie sie auch von Planelles u. Werner (9) und von Brams (10) nach Digitalisvergiftungen beschrieben worden sind. Auf diese elektrokardiographischen Befunde und ihren Zusammenhang mit der Höhe der Zusatzdosen werde ich noch näher eingehen (vgl. unten S. 718ff).

<sup>1</sup> Vgl. Arch. f. exper. Path. 172, 693 (1933) (vorangehende Arbeit).

Bestimmt man bei solchen Katzen die Zusatzdosen, dann findet man in der Mehrzahl der Fälle, die ausgesprochen klinische Erscheinungen und auch elektrokardiographisch nachweisbare Störungen aufweisen, Tod schon nach kleinen Zusatzdosen. Die klinisch normalen Tiere, besonders Tiere, die keine nachweisbaren Herzschädigungen aufweisen, benötigen durchweg hohe Zusatzdosen. Nur in seltenen Ausnahmen habe ich auch Tiere beobachtet, die trotz schwerer klinischer Erscheinungen auffallend hohe Zusatzdosen verbrauchten. Nach den Beobachtungen von Weese u. Weilguny (11) sind fiebernde Tiere gegen Digitalisvergiftung auffallend resistent. Man könnte also daran denken, daß einzelne in dieser Richtung aus der Reihe fallende Werte dadurch zu erklären wären. Ich hatte aber bei mehreren Tieren, die extrem hohe Zusatzdosen benötigten, die Temperaturen gemessen und normal gefunden.

Die Versuche mit hohen Vordosen von 0,14 und 0,17 mg/kg Digitoxin zeigen also, daß ein sehr beträchtlicher Teil der Tiere sich keineswegs so verhält, wie man es auf Grund der Annahme einer im Herzen festhaftenden und lediglich langsam verschwindenden Quantität eines Glykosids erwarten sollte. Diese Annahme würde ebenso wie langsam zunehmende Zusatzdosen auch eine langsame Besserung der Vergiftungserscheinungen und des Allgemeinzustandes fordern. Wir sehen aber bei einem sehr großen Teil unserer Tiere das Gegenteil, nämlich sogar im Laufe einiger Tage eine Verschlechterung bis zum Spontantod unter Erscheinungen der Digitalisvergiftung. Ein derartiger Verlauf steht durchaus im Widerspruch mit der Annahme, daß die Kumulierungserscheinungen lediglich auf der Anwesenheit einer bestimmten Menge Glykosid im Herzen beruhen, die nur langsam verschwindet.

Da wir nicht annehmen können, daß sich die Glykosidmenge im Herzen vergrößert (denn Weese hat nachgewiesen, daß alles peripher gebundene Glykosid für die Vergiftung des Herzens nicht mehr in Betracht kommt), bleibt also nur die Möglichkeit, daß diese zunehmenden Vergiftungserscheinungen nicht durch anwesendes Glykosid, sondern durch Veränderungen hervorgerufen sind, die durch die erste Vergiftung teils primär, teils sekundär im Herzen entstanden sind. Es wäre daraus zu folgern, daß die Kumulierungserscheinungen nicht auf einer Addition von Glykosidsubstanz im Herzen beruhen, sondern auf Addition von Wirkungen, die durch die vorübergehende Anwesenheit des Glykosids im Herzen verursacht worden sind.

### 3. Die Höhe der beobachteten Zusatzdosen.

Scheiden wir die Tiere, die ohne Zusatzdosen unter zunehmenden Vergiftungserscheinungen spontan gestorben sind, aus unseren Betrachtungen aus, dann finden wir auch den verbleibenden Rest der Tiere keineswegs in Übereinstimmung mit der Hatcher'schen Kumulierungskurve.

In meiner ersten Versuchsreihe mit einer Vordose von 0,10 mg Digitoxin pro Kilogramm waren 40% der letalen Dose nach Hatcher u. Brody gegeben. Entsprechend der Kurve von Hatcher müßten davon nach 48 Stunden noch mindestens 35% der letalen Dose im Herzen vorhanden sein (vgl. Tabelle 1). Bei der Anzahl von Einzelversuchen, die ich für diese Beobachtungszeit zur Verfügung habe, ist es unmöglich, daß eine derartige Differenz von 35% übersehen würde. Wir stellen indessen schon nach 24 Stunden eine Zusatzdosis von 90%, nach 48 Stunden aber und später solche von 98%, also volle Zusatzdosen fest. Diese Versuche können also unter dem Gesichtspunkt der Speicherungstheorie von Hatcher nur so gedeutet werden, daß das Glykosid aus dem Herzen bei weitem rascher verschwindet, als es der Kurve von Hatcher entspricht.

Dasselbe sehen wir auch in den Versuchen mit höheren Vordosen, sowie wir die spontan gestorbenen Tiere ausscheiden. Die Vordose von 0,14 mg Digitoxin pro Kilogramm würde rund 57% der letalen Dose nach Hatcher u. Brody entsprechen. Nach der Hatcher'schen Kumulierungskurve (vgl. Tabelle 1) müßten davon nach 8 Tagen noch 40% der letalen Dose im Herzen vorhanden sein. Wir finden indessen nach diesem Zeitraum nahezu die volle Zusatzdosis bis zum Eintritt des Herztodes erforderlich, sehen also auch in diesen Versuchen, daß das Glykosid bei weitem rascher aus dem Herzen verschwunden ist als die Kumulierungskurve von Hatcher erwarten ließe. Sieht man die weiteren Daten der Tabellen 3 und 4, bei der höheren Vordosis und nach verschiedenen Zeiten im Vergleich mit den Zahlen von Tabelle 1 durch, dann finden wir diese Feststellung immer wieder bestätigt.

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich, daß auch die Versuche, die nicht durch Spontanod endigten, keineswegs mit der Hatcher'schen Speicherungstheorie übereinstimmen. Während jene Fälle durch zunehmende Vergiftungserscheinungen bis zum Tod charakterisiert waren, also überhaupt kein Verschwinden des Glykosids aus dem Herzen erkennen ließen, deutet der Rest der Versuche auf ein wesentlich rascheres Verschwinden des Glykosids aus dem Herzen hin. Bei kleinen Dosen scheint das Glykosid sogar nach 48 Stunden schon vollständig aus dem Herzen verschwunden zu sein. Damit haben wir noch weniger Be-

rechtigung, langdauernde Kumulierungserscheinungen auf eine langdauernde Anwesenheit von Glykosid im Herzen zurückzuführen.

## II. Kumulierungsversuche mit wiederholten kleinen Dosen.

Die in der klinischen Praxis beobachteten Kumulierungserscheinungen sind meistens die Folge von relativ kleinen Digitalisdosen, die öfters gegeben werden. Um einen weiteren Einblick in die Gesetzmäßigkeiten der Kumulierung zu erhalten, habe ich an Stelle der einmaligen Vordose in kurzen Zeitabständen mehrere kleine Dosen gegeben, um später eventuell mit Strophanthin die noch letale Dose zu bestimmen. Versuche ähnlicher Art sind, allerdings an Kaninchen, schon von Fränkel




Tabelle 5. Wiederholt gegebene Dosen von Digitoxin. Digitoxinlösung 1/50000 in physiologischer NaCl-Lösung + 10% Alkohol. † = gestorben nach

| Katze<br>Nr. | I. Dose<br>in<br>mg/kg | II. Dose<br>in<br>mg/kg | III. Dose<br>in<br>mg/kg | IV. Dose<br>in<br>mg/kg | V. Dose<br>in<br>mg/kg | VI. Dose<br>in<br>mg/kg | Gesamt-<br>menge<br>in<br>mg/kg | Spontan-<br>tod, Stunden<br>nach letzter Infusion,<br>oder Zusatzdosis in %<br>der letalen Dosis |
|--------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131          | 0,12                   | 0,12                    | 0,10                     | —                       | —                      | —                       | 0,32                            | † 1 Stunde                                                                                       |
| 132          | 0,12                   | 0,12                    | —                        | —                       | —                      | —                       | 0,24                            | † 5 Minuten                                                                                      |
| 134          | 0,12                   | 0,12                    | —                        | —                       | —                      | —                       | 0,24                            | † 48 Stunden                                                                                     |
| 135          | 0,10                   | 0,10                    | —                        | —                       | —                      | —                       | 0,20                            | † 24 Stunden                                                                                     |
| 138          | 0,10                   | 0,10                    | 0,10                     | —                       | —                      | —                       | 0,30                            | † 12 Stunden                                                                                     |
| 141          | 0,10                   | 0,10                    | 0,10                     | —                       | —                      | —                       | 0,30                            | † 12 Stunden                                                                                     |
| 156          | 0,10                   | 0,06                    | 0,06                     | —                       | —                      | —                       | 0,22                            | † 1 Stunde                                                                                       |
| 137          | 0,08                   | 0,08                    | 0,08                     | —                       | —                      | —                       | 0,24                            | † 12 Stunden                                                                                     |
| 178          | 0,06                   | 0,05                    | 0,05                     | 0,05                    | 0,05                   | 0,05                    | 0,31                            | 105                                                                                              |
| 179          | 0,06                   | 0,05                    | 0,05                     | 0,05                    | 0,05                   | 0,05                    | 0,31                            | 92                                                                                               |
| 180          | 0,06                   | 0,05                    | 0,05                     | 0,05                    | —                      | —                       | 0,21                            | † Wundinfektion                                                                                  |
| 181          | 0,06                   | 0,05                    | 0,05                     | 0,05                    | 0,05                   | 0,05                    | 0,31                            | 104                                                                                              |
| 182          | 0,06                   | 0,05                    | 0,05                     | 0,05                    | —                      | —                       | 0,21                            | † Pneumonie                                                                                      |

entspricht der jeweils neu infundierten Menge Digitoxin, der helle Teil der Säulen der Menge Digitoxin, die nach den einzelnen Perioden, auf Grund der Berechnung des Verschwindens nach der Kurve von Hatcher (vgl. Tabelle 1) noch im Herzen anzunehmen wäre. Die breiten Säulen zeigen die Dosen Digitoxin an, die innerhalb von verschiedenen Zeiten im Mittel als letal zu betrachten sind.

Ergebnisse: 0,10 mg pro Kilogramm ist eine Dosis Digitoxin, die nur in ganz vereinzelt Fällen Herzsymptome verursacht und die nur ausnahmsweise Kumulierungserscheinungen bewirkt (vgl. Tabelle 2). Praktisch scheint sie also fast wirkungslos. Geben wir diese Dosis von 0,10 mg/kg jeden zweiten Tag, dann überleben die Tiere die dritte Dosis nie; meistens sterben sie schon nach der zweiten Dosis. Der Tod tritt hier also nach Gesamtdosen ein, wie sie etwa der zeitlosen letalen Dosis des Digitoxins entsprechen. Diese Befunde sind also auch im Einklang mit der Hatterschen Kumulierungskurve und der Speicherungstheorie.

Ein völlig anderes Bild geben die Versuche aber, wenn man jeden zweiten Tag nur 0,05 mg Digitoxin pro Kilogramm intravenös injiziert. Diese Dosis wird von den Tieren mehrfach wiederholt gut vertragen, ohne daß irgendwelche Erscheinungen nachweisbar geworden wären. Von einer Serie von fünf Katzen, die in dieser Weise behandelt wurden, starb eine an einer Pneumonie, eine zweite an einer Wundinfektion, beide also nicht an Digitoxinwirkungen. Die restlichen drei Tiere wurden nach 10 Tagen, also nachdem sie 6mal 0,05 mg Digitoxin pro Kilogramm er-

halten hatten, nach der Methode von Hatcher mit g-Strophanthin aufgefüllt. Bei allen war die volle, auch für normale Katzen erforderliche letale Dose Strophanthin nötig, um den Herztod herbeizuführen.

Berechnet man nach der Ausscheidungskurve von Hatcher die Menge Digitoxin, die bei diesen Tieren noch im Herzen vorhanden sein müßte, dann wäre das noch bedeutend mehr als eine Dose, die einmalig gegeben innerhalb von 3 Stunden letal wäre. Denn nach den Angaben von Hatcher verschwindet innerhalb von 48 Stunden immer nur 10% des jeweils im Herzen vorhandenen Digitoxins. Aus diesen Versuchen sieht man also: Bei Wiederholung der Dose von 0,10 mg/kg entsprach die Wirkung einer vollen Addition; bei wiederholten Gaben von 0,05 mg/kg aber fehlte die Kumulierung überhaupt.

Diese Beobachtungen widersprechen vollkommen der Annahme einer Kumulierung der Substanz, wie sie Hatcher fordert. Nach chemischen Gesetzmäßigkeiten muß von einer Substanz absolut um so mehr zerfallen oder sonst verschwinden, je mehr von ihr vorhanden ist. Es ergibt sich aber bei diesen Versuchen, daß die geringere Menge praktisch völlig verschwindet, die größere aber sich addiert. Der Verlauf dieser Versuche entspricht also in keiner Weise dem Verlauf, den man unter der Annahme der Speicherungstheorie nach physikochemischen Gesetzmäßigkeiten erwarten müßte. Andererseits ist gerade der Verlauf dieser Versuche am besten durch die Annahme einer reinen Addierung von Wirkungen, im Gegensatz zu einer Addition fraktioniert gegebener Substanzmengen erklärt: Nur eine Dose von einem bestimmten Schwellenwert bringt Wirkungen hervor, die sich addieren können; nur solche Dosen kumulieren. Kleinere Dosen aber verursachen überhaupt keine Wirkungen und kumulieren deshalb auch nicht. In Übereinstimmung mit den Versuchen des vorigen Abschnitts zeigen deshalb auch diese Versuche, daß auch Digitoxin in kleinen Dosen sehr rasch, meistens innerhalb 48 Stunden vollständig aus dem Herzen verschwindet. Nachdem das für kleine Dosen als nachgewiesen betrachtet werden kann, ist entsprechend chemischen Überlegungen (vgl. S. 700 ff.) auch anzunehmen, daß auch größere Dosen in der gleichen Geschwindigkeit im Herzen zerstört oder in anderer Weise beseitigt werden, daß demnach die später beobachteten Wirkungen auf Veränderungen und nicht auf Glykosidsubstanz im Herzen beruhen müssen.

### III. Elektrokardiographische Beobachtungen.

Die beschriebenen Versuche führten zu dem Ergebnis, daß man sich von der Vorstellung eines langsamen Abbaues oder Zerfalls des Glykosids im Herzen frei machen muß. Geht man von der Vorstellung aus, daß

das Digitoxin vor seinem relativ raschen Verschwinden im Herzen irgendwelche Veränderungen oder Schäden setzt, die sich weiter auswirken und entsprechend individueller Empfindlichkeit wieder Schäden sekundärer Art zeitigen können, von deren Umfang die Kumulierung und die Höhe einer Zusatzdose abhängig ist, dann lag der Versuch nahe, sich durch das EKG von dem Zustand des Herzens ein Bild zu verschaffen und zu prüfen, ob eventuell so nachweisbare Schäden in ursächlichem Zusammenhang mit der weiteren Digitalisempfindlichkeit des Herzens stehen, die durch die Zusatzdose geprüft wird.

Es wurden deshalb an etwa 60 der Tiere der Tabellen 2—4 Elektrokardiogramme aufgenommen. Wie zu erwarten, liegen diese Verhältnisse nicht einfach und ich kann hier über die bisherigen Beobachtungen nur insoweit berichten, als es in Zusammenhang dieser Mitteilung erforderlich ist. Die Versuche werden fortgesetzt und es soll darüber in Verbindung mit anderen Beobachtungen in einer zweiten Mitteilung berichtet werden.

Vor der Infusion der Vordose wurde das normale EKG der Katze aufgenommen. Bei kurz dauernden Versuchen wurde ein zweites EKG 12—24 Stunden vor der Strophanthininjektion geschrieben. Bei den langdauernden Versuchen wurden außer dem normalen EKG eines 2—6 Tage nach der Vordose und ein zweites vor der Zusatzdose aufgenommen.

Zu den Versuchen diente der Tintenelektrokardiograph von Duchosal u. Lüthy (13), der in I. Ableitung angeschlossen wurde. Die Nadeln wurden links oberhalb der Clavicula und rechts seitlich unterhalb des Rippenbogens eingestochen. Auf irgendwelche Narkose wurde verzichtet. Die Tiere wurden nur in natürlich sitzender Haltung auf einem Brett festgeschnallt. Es ist allerdings dabei nicht immer leicht, die Tiere zu beruhigen und den richtigen Augenblick zur Aufnahme zu erfassen.

Bei den Versuchen wurden alle Kriterien, die im allgemeinen als Zeichen von Herzschädigung gelten, gefunden. Am häufigsten beobachtet man negative T-Zacken, bisweilen auch Zeichen von vergrößertem Vorhof und verlängertes CV-Intervall. Die meisten Autoren betrachten die negative T-Zacke als typisches Zeichen für Digitalisschädigung. Da bei meinen Versuchen die negative T-Zacke in den meisten Fällen festzustellen war, in denen schwere klinische Erscheinungen vorlagen und danach niedere Zusatzdosen gebraucht wurden, betrachte ich sie als wichtigstes Kriterium. Ich bin mir dabei aber bewußt, daß es noch ausführlicher Untersuchungen bedarf, um die Beziehungen zwischen Veränderungen des EKG und Kumulierungserscheinungen aufzuklären. In der mir zugänglichen Literatur fand ich nur bei Brams (10) Ausführungen, mit denen er es ablehnt, aus der negativen T-Zacke Schlüsse auf

die Schwere der Digitalisvergiftung zu ziehen. Es verdient bemerkt zu werden, daß ich wiederholt Katzen beobachtet habe, die bei der ersten Aufnahme vor der Vordose ein pathologisches EKG hatten, das nach der ersten Dose Digitalis normal wurde. Nur in Ausnahmefällen brauchte ich für eine Katze mit negativer T-Zacke eine hohe Zusatzdosis. Viel häufiger fand ich, besonders bei den langdauernden Versuchen, überhaupt keine Veränderungen des EKG, und schwere und interessante Störungen konnten nur in einer Minderzahl der Fälle festgestellt werden (s. Abb. 2—5).

Wie aus diesen Beispielen zu sehen, konnte die Vermutung, daß Tiere, die kleine Zusatzdosen brauchen, auch besonders schwere elektrokardiographische Störungen aufweisen, zwar oft, doch bei weitem nicht in allen Fällen eindeutig bestätigt werden. Bei der Natur des EKG, das eine schwer zu differenzierende Summe von Einzelveränderungen registriert, war ein eindeutigeres Resultat kaum zu erwarten. Immerhin waren bei der beschränkten Zahl meiner Versuche mehrere typische Fälle zu beobachten, die der Annahme entsprachen, und in allen Fällen, die eine ausgesprochen geringe Zusatzdosis verbrauchten, waren deutliche Veränderungen des EKG festzustellen. Andererseits verbrauchten auch wieder vereinzelte Tiere mit starken Veränderungen des EKG große Zusatzdosen. Wenn auch hier eine verhältnismäßig lange Zeitdauer zwischen der letzten elektrokardiographischen Aufnahme und der Zusatzdosis mitspielen kann, so bleiben doch Unstimmigkeiten in dem supponierten Parallelismus zwischen Schwere elektrokardiographischer Störungen und Sinken der Zusatzdosis, die der weiteren Aufklärung bedürfen.

### B. Gitalin-Kraft.

Mein ursprüngliches Problem war der Vergleich der kumulierenden Eigenschaften verschiedener Digitalisglykoside. Die vorhandenen Unstimmigkeiten, die teilweise schon aus der Arbeit von Fromherz u. Welsch (7) ersichtlich sind, und die bei weiteren Versuchen erneut zutage traten, machten es aber nötig, zunächst die Frage der Kumulierung überhaupt einer Nachprüfung zu unterziehen. Hierzu eignete sich am besten das Digitoxin, das bekanntermaßen die stärksten Kumulierungserscheinungen zeigt. Nur solche Versuche konnten die für den beabsichtigten Vergleich erforderliche Grundlage abgeben.

Als Grundlage für die Kumulierungsversuche mit Gitalin wurde die Wirksamkeit des Präparates von Gitalin-Kraft (vgl. oben S. 704) nach der Methode von Magnus-de Lind van Wijngaarden an frischen Katzen bestimmt.

## Beispiele:




Abb. 2. 1. Katze Nr. 191 (Tabelle 2 Nr. 17). Vordose: 0,10 mg Digitoxin pro Kilogramm. a normal, b nach 6 Tagen, c nach 13 Tagen.

Blieb normal: Nach 14 Tagen: Zusatzdose 112%.




Abb. 3. 2. Katze Nr. 188 (Tabelle 3 Nr. 51). Vordose: 0,14 mg Digitoxin pro Kilogramm. a normal, b nach 6 Tagen gestört, c nach 13 Tagen gebessert.

Vorübergehende Störungen: Nach 14 Tagen: Zusatzdose: 86%.




Abb. 4. 3. Katze Nr. 120 (Tabelle 3 Nr. 49). Vordose: 0,14 mg Digitoxin pro Kilogramm. a normal (Tachykardie, erregt), b nach 48 Stunden negative T-Zacke, c nach 14 Tagen schwere Störungen.

Nach 14 Tagen: Zusatzdose: 61%.




Abb. 5. 4. Katze Nr. 211 (Tabelle 4 Nr. 26). Vordose: 0,17 mg Digitoxin pro Kilogramm. a normal, b nach 48 Stunden negative T-Zacke.

Nach 48 Stunden: Zusatzdose: 66%.

Tabelle 6. Gitalin-Kraft, letale Dose für die Katze bei der Infusion nach Magnus.

| Katze<br>Nr. | Gewicht in g | Infusionsdauer<br>in Minuten | Dosis letalis |          |
|--------------|--------------|------------------------------|---------------|----------|
|              |              |                              | in mg         | in mg/kg |
| 1            | 3310         | 46                           | 2,006         | 0,6061   |
| 2            | 3350         | 43                           | 2,874         | 0,8579   |
| 3            | 3600         | 55                           | 2,926         | 0,8120   |
| 4            | 3900         | 60                           | 2,920         | 0,7480   |
| 5            | 2090         | 38                           | 1,596         | 0,7630   |
| 6            | 2840         | 41                           | 2,180         | 0,7670   |
|              |              |                              | Mittel:       | 0,7590   |

Nach verschiedenen Angaben der Literatur soll Gitalin-Kraft am wenigsten kumulieren, hierin also gewissermaßen ein Gegenstück zu Digitoxin bilden. Die Kumulierungsversuche mit Gitalin-Kraft habe ich in derselben Weise wie mit Digitoxin mit verschiedenen Vordosen angestellt. Es wurden wieder nach verschiedenen Zeiten aus der Gesamtzahl der mit der gleichen Vordose injizierten Tiere einzelne Gruppen zur Bestimmung der Zusatzdosen mit g-Strophanthin entnommen. Eine Übersicht über diese Versuche geben die Tabellen 7—9.

Wenn wir die Ergebnisse dieser Versuche mit den Befunden mit Digitoxin (Tabellen 2—4) vergleichen, dann fällt zunächst auf, daß wir

Tabelle 7. Kumulierungsversuche nach Hatcher mit Vordosen von 0,30 mg Gitalin-Kraft pro Kilogramm.

| Katze<br>Nr.          | Katzen-Gewichte bei der |                      | Beendigung der<br>Versuche<br>nach Zeit | Zusatzdose g-Strophanthin |                           |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                       | I. Infusion<br>in g     | II. Infusion<br>in g |                                         | in mg<br>pro Kilogramm    | in % der<br>Dosis letalis |
| 1                     | 2800                    | 2640                 | 24 Stunden                              | 0,0833                    | 87                        |
| 2                     | 3130                    | 2820                 |                                         | 0,1141                    | 118                       |
| 3                     | 2530                    | 2290                 |                                         | 0,0917                    | 95                        |
| 4                     | 2360                    | 2230                 |                                         | 0,0816                    | 85                        |
| Mittel:               |                         |                      |                                         | 0,0926                    | 96%                       |
| 5                     | 1970                    | —                    | 24 Stunden                              | ohne Zusatzdose gestorben |                           |
| 6                     | 2060                    | 1890                 | 48 Stunden                              | 0,1016                    | 105                       |
| 7                     | 2480                    | 2350                 |                                         | 0,1082                    | 112                       |
| 8                     | 1930                    | 1650                 |                                         | 0,0830                    | 87                        |
| 9                     | 3340                    | 2760                 |                                         | 0,0863                    | 90                        |
| 10                    | 3020                    | 2770                 |                                         | 0,1028                    | 106                       |
| Mittel <sup>1</sup> : |                         |                      |                                         | 0,0963                    | 100%                      |

<sup>1</sup> Ein Versuch an einer zu kleinen Katze, wegen extrem hoher Zusatzdose gestrichen.

Tabelle 8. Kumulierungsversuche nach Hatcher mit Vordosen von 0,50 mg Gitalin-Kraft pro Kilogramm.

| Katze<br>Nr.          | Katzen-Gewichte bei der |                      | Beendigung der<br>Versuche<br>nach Zeit | Zusatzdosis g-Strophanthin |                           |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                       | I. Infusion<br>in g     | II. Infusion<br>in g |                                         | in mg<br>pro Kilogramm     | in % der<br>Dosis letalis |
| 1                     | 3530                    | 3320                 | 24 Stunden                              | 0,1087                     | 112                       |
| 2                     | 3340                    | 3130                 |                                         | 0,0629                     | 65                        |
| 3                     | 1670                    | 1450                 |                                         | 0,1020                     | 106                       |
| 4                     | 3020                    | 2840                 |                                         | 0,0845                     | 88                        |
| 5                     | 2240                    | 2090                 |                                         | 0,0698                     | 72                        |
| Mittel <sup>1</sup> : |                         |                      |                                         | 0,0874                     | 88%                       |
| 6                     | 2920                    | —                    | 36 Stunden                              | ohne Zusatzdosis gestorben |                           |
| 7                     | 2360                    | 2130                 | 48 Stunden                              | 0,1056                     | 109                       |
| 8                     | 2640                    | 2480                 |                                         | 0,0762                     | 79                        |
| 9                     | 3190                    | 2880                 |                                         | 0,0434                     | 45                        |
| 10                    | 3030                    | 2740                 |                                         | 0,0978                     | 101                       |
| 11                    | 2320                    | 2100                 |                                         | 0,0723                     | 75                        |
| Mittel <sup>1</sup> : |                         |                      |                                         | 0,0791                     | 82%                       |
| 12                    | 2570                    | —                    | 60 Stunden                              | ohne Zusatzdosis gestorben |                           |
| 13                    | 3170                    | —                    | 4 Tage                                  |                            |                           |
| 14                    | 1970                    | 1670                 | 8 Tage                                  | 0,1059                     | 109                       |
| 15                    | 3240                    | 2910                 |                                         | 0,0774                     | 80                        |
| 16                    | 3140                    | 2650                 |                                         | 0,0637                     | 66                        |
| 17                    | 1960                    | 1620                 |                                         | 0,0685                     | 71                        |
| 18                    | 2460                    | 2260                 |                                         | 0,0570                     | 60                        |
| Mittel:               |                         |                      |                                         | 0,0745                     | 77%                       |
| 19                    | 2190                    | —                    | 9 Tage                                  | ohne Zusatzdosis gestorben |                           |
| 20                    | 1690                    | 1500                 | 14 Tage                                 | 0,1004                     | 104                       |
| 21                    | 2310                    | 2040                 |                                         | 0,0813                     | 85                        |
| 22                    | 3000                    | 2800                 |                                         | 0,1096                     | 113                       |
| 23                    | 2000                    | 1530                 |                                         | 0,0961                     | 100                       |
| 24                    | 2720                    | 2240                 |                                         | 0,1145                     | 118                       |
| 25                    | 2540                    | 2210                 |                                         | 0,0981                     | 102                       |
| 26                    | 2970                    | 2550                 |                                         | 0,1176                     | 121                       |
| Mittel:               |                         |                      |                                         | 0,1025                     | 106%                      |

bei Gitalin-Kraft für alle Versuche im Verhältnis zu der nach Magnus letalen Dosis wesentlich höhere Vordosen verwenden mußten. Wir haben bei Digitoxin Vordosen von 25, 35 und 42,5% der nach Magnus letalen

<sup>1</sup> In den Gruppen von 24 und 48 Stunden wurde je ein Versuch gestrichen wegen extrem hoher Zusatzdosis!

Tabelle 9. Kumulierungsversuche nach Hatcher mit Vordosen von 0,60 mg Gitalin-Kraft pro Kilogramm.

| Katze<br>Nr. | Katzen<br>Gewicht in g bei der |              | Beendigung der<br>Versuche<br>nach Zeit | Zusatzdosen g-Strophanthin   |                           |
|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|              | I. Infusion                    | II. Infusion |                                         | in mg pro<br>Kilogramm       | in % der<br>Dosis letalis |
| 1            | 2440                           | —            | 2 Minuten                               | ohne Zusatzdose<br>gestorben |                           |
| 2            | 2380                           | —            | 5 "                                     |                              |                           |
| 3            | 2240                           | —            | 10 "                                    |                              |                           |
| 4            | 2580                           | —            | 20 "                                    |                              |                           |
| 5            | 1690                           | —            | 23 "                                    |                              |                           |
| 6            | 2000                           | —            | 2 Stunden                               |                              |                           |
| 7            | 2790                           | —            | 6 "                                     |                              |                           |
| 8            | 2420                           | —            | 24 "                                    |                              |                           |
| 9            | 4000                           | —            | 24 "                                    |                              |                           |
| 10           | 1870                           | 1800         | 24 Stunden                              | 0,1121                       | 116                       |
| 11           | 3100                           | 2970         |                                         | 0,0889                       | 92                        |
| 12           | 1970                           | 1810         |                                         | 0,0903                       | 94                        |
| 13           | 2970                           | 2700         |                                         | 0,0638                       | 66                        |
| 14           | 2410                           | 2160         |                                         | 0,0929                       | 96                        |
| 15           | 2510                           | 2260         |                                         | 0,0580                       | 60                        |
| 16           | 2460                           | 2290         |                                         | 0,0581                       | 60                        |
| Mittel 1:    |                                |              |                                         | 0,0805                       | 84                        |
| 17           | 3020                           | 2760         | 48 Stunden                              | 0,0717                       | 74                        |
| 18           | 1850                           | 1640         |                                         | 0,1121                       | 116                       |
| 19           | 1780                           | 1570         |                                         | 0,1006                       | 104                       |
| 20           | 3750                           | 3350         |                                         | 0,0674                       | 70                        |
| 21           | 3310                           | 2980         |                                         | 0,0771                       | 80                        |
| 22           | 2000                           | 1840         |                                         | 0,0788                       | 81                        |
| 23           | 2910                           | 2650         |                                         | 0,0655                       | 68                        |
| 24           | 2000                           | 1800         |                                         | 0,0861                       | 90                        |
| 25           | 2150                           | 1820         |                                         | 0,1054                       | 109                       |
| Mittel:      |                                |              |                                         | 0,0849                       | 89                        |
| 26           | 2050                           | 1890         | 72 Stunden                              | 0,0836                       | 87                        |
| 27           | 2700                           | 2430         |                                         | 0,0720                       | 75                        |
| Mittel:      |                                |              |                                         | 0,0778                       | 81                        |
| 28           | 1980                           | —            | 5 Tage                                  | ohne Zusatzdose<br>gestorben |                           |
| 29           | 2380                           | —            | 6 "                                     |                              |                           |
| 30           | 3220                           | 2910         | 8 "                                     | 0,0670                       | 70                        |
| 31           | 2110                           | 1990         |                                         | 0,1140                       | 118                       |
| 32           | 2120                           | 2000         |                                         | 0,0545                       | 56                        |
| 33           | 3140                           | 2650         |                                         | 0,0611                       | 64                        |
| 34           | 2060                           | 1750         |                                         | 0,0514                       | 53                        |
| 35           | 3320                           | 2650         |                                         | 0,0883                       | 92                        |
| Mittel 1:    |                                |              |                                         | 0,0723                       | 75                        |
| 36           | 2490                           | —            | 13 Tage                                 | ohne Zusatzdose<br>gestorben |                           |
| 37           | 2380                           | 1950         | 14 "                                    |                              |                           |
| 38           | 2350                           | 1660         |                                         | 0,0843                       | 88                        |
| 39           | 2840                           | 2850         |                                         | 0,1214                       | 125                       |
| 40           | 2500                           | 2500         |                                         | 0,1080                       | 112                       |
| 41           | 2740                           | 2770         |                                         | 0,1194                       | 123                       |
| 42           | 3200                           | 2550         |                                         | 0,0753                       | 78                        |
| Mittel 1:    |                                |              |                                         | 0,1015                       | 105                       |

<sup>1</sup> In dieser Versuchsreihe wurde in den Gruppen von 24 Stunden, 8 Tagen und 14 Tagen je ein Versuch mit extrem hoher Zusatzdosis gestrichen.

Dose verwendet. Demgegenüber sehen wir einen ähnlichen Verlauf der Versuche mit Gitalin-Kraft bei Vordosen von 38, 64 und 77% der nach Magnus letalen Dose. Aus diesen Zahlen allein geht schon hervor, daß der Unterschied zwischen der durch eine an eine festgelegte Zeit gebundene Infusionstechnik tödlichen Dose und der tödlichen Dose bei zeitloser Beobachtung bei Gitalin-Kraft ein weit geringerer ist als bei Digitoxin. Mit anderen Worten: die beobachteten Spättode treten bei Gitalin-Kraft erst bei Dosen ein, die der bei der Infusion nach Magnus tödlichen Dose sehr viel näher liegen als bei Digitoxin.

Wir sehen, daß bei einer Vordose von 0,30 mg Gitalin-Kraft pro Kilogramm, also 38% der nach der Methode von Magnus letalen Dose, von 13 Tieren nur eines spontan gestorben ist. Im Gegensatz dazu waren bei Digitoxin nach einer Vordose von 35% der nach der Methode von Magnus tödlichen Dose über 50% der injizierten Tiere dem Spontantod erlegen. Über das Verhalten der Tiere nach größeren Vordosen Gitalin-Kraft bei zeitloser Beobachtung orientieren die Tabellen 8a und 9a, die ganz entsprechend den Tabellen 3a und 4a zu lesen sind. Aus denselben ersehen wir, daß auch bei Vordosen von 64 und 77% der nach der Methode von Magnus tödlichen Dose nur 29 bzw. 40% der injizierten Tiere ohne Zusatzdosen gestorben sind, während bei Digitoxin schon nach 42% der nach Magnus letalen Dose 80% der Tiere spontan starben.

Dieses Verhalten der Tiere bei zeitloser Beobachtung ist als ein Kriterium der Entwicklung der Folgen einer einmaligen Injektion innerhalb

Tabelle 8a. Versuchsreihe von Tabelle 8. Ohne Zusatzdose gestorbene Tiere. Vordose: 0,50 mg Gitalin-Kraft pro Kilogramm. Reihe von 28 Katzen.

| Nach Zeit  | lebend | Zum Zweck<br>des Ausfüll-<br>versuches aus<br>der Reihe<br>entnommen | Rest | In der folgenden Periode ohne Zusatzdose<br>gestorben |                           |                                          |                                 |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|            |        |                                                                      |      | vom noch<br>vorhandenen<br>Bestand                    | Berechnet auf die<br>Zahl | für die<br>einzelnen<br>Perioden<br>in % | Gesamtzahl<br>insgesamt<br>in % |
| 24 Stunden | 28     | 6                                                                    | 22   | 1                                                     | 1,27                      | 4,5                                      | 4,5                             |
| 48 „       | 21     | 6                                                                    | 15   | 1                                                     | 1,8                       | 6,5                                      | 11,0                            |
| 4 Tage     | 14     | —                                                                    | 14   | 1                                                     | 1,9                       | 6,8                                      | 17,8                            |
| 8 „        | 13     | 5                                                                    | 8    | —                                                     | —                         | —                                        | 17,8                            |
| 9 „        | 8      | —                                                                    | 8    | 1                                                     | 3,1                       | 11,1                                     | 28,9                            |
| 14 „       | 7      | 7                                                                    | 0    | —                                                     | —                         | —                                        | 28,9                            |

Innerhalb von 14 Tagen sind also aus der ganzen Reihe insgesamt 28,9% der Tiere ohne Zusatzdose gestorben.

Tabelle 9a. Versuchsreihe von Tabelle 9. Ohne Zusatzdose gestorbene Tiere.  
Vordose: 0,60 mg Gitalin-Kraft pro Kilogramm. Reihe von 45 Katzen.

| Nach Zeit  | lebend | Zum Zweck<br>des Ausfüll-<br>versuches aus<br>der Reihe<br>entnommen | Rest | In der folgenden Periode ohne Zusatzdose<br>gestorben |                           |                                          |                                 |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|            |        |                                                                      |      | vom noch<br>vorhandenen<br>Bestand                    | Berechnet auf die<br>Zahl | für die<br>einzelnen<br>Perioden<br>in % | Gesamtzahl<br>insgesamt<br>in % |
| Beginn:    | 45     | 0                                                                    | 45   | 9                                                     | 9                         | 20,0                                     | 20,0                            |
| 24 Stunden | 36     | 8                                                                    | 28   | —                                                     | —                         | —                                        | 20,0                            |
| 48 „       | 28     | 9                                                                    | 19   | —                                                     | —                         | —                                        | 20,0                            |
| 72 „       | 19     | 2                                                                    | 17   | —                                                     | —                         | —                                        | 20,0                            |
| 5 Tage     | 17     | —                                                                    | 17   | 1                                                     | 2,1                       | 4,7                                      | 24,7                            |
| 6 „        | 16     | —                                                                    | 16   | 1                                                     | 2,2                       | 4,9                                      | 29,6                            |
| 8 „        | 15     | 7                                                                    | 8    | —                                                     | —                         | —                                        | 29,6                            |
| 13 „       | 8      | —                                                                    | 8    | 1                                                     | 4,3                       | 9,2                                      | 38,8                            |
| 14 „       | 7      | 7                                                                    | 0    | —                                                     | —                         | —                                        | 38,8                            |

Innerhalb von 14 Tagen sind also aus der ganzen Reihe insgesamt 38,8% der Tiere ohne Zusatzdose gestorben.

längerer Zeit, also auch der kumulativen Wirkung aufzufassen. Durch den einfachen Vergleich der genannten Zahlen ergibt sich also ohne weiteres, daß das Gitalin-Kraft bei weitem weniger stark kumuliert als das Digitoxin, eine Feststellung, die als Bestätigung entsprechender Befunde nicht nur von Hatcher sondern auch einer Reihe anderer Nachuntersucher aufzufassen ist.

Trotzdem müssen wir feststellen, daß der Unterschied des Gitalins-Kraft vom Digitoxin in dieser Richtung keineswegs ein qualitativer ist und daß wir alle Beobachtungen, die wir bei Digitoxin gesehen haben, auch bei dem „nicht kumulierenden“ Gitalin wiederfinden, und daß wir lediglich quantitative Unterschiede in Dosen, Dosenverhältnissen und in der Häufigkeit der Spontanodesfälle feststellen können. Das müssen wir hauptsächlich im Gegensatz zu den Angaben von Hoekstra (14) und van Esveld (15) hervorheben, die dem Gitalin jede kumulative Eigenschaft absprechen. Van Esveld kommt vielleicht dadurch zu seinen abweichenden Ergebnissen, daß er grundsätzlich alle Werte, die über 25% von einem Mittelwert abweichen, ausscheidet, ein Verfahren, das uns, wie oben ausgeführt, nicht berechtigt erscheint.

Betrachten wir die Zusatzdosen, die wir mit den überlebenden Tieren nach Vordosen von Gitalin-Kraft benötigt haben, dann finden wir sie durchweg auffallend hoch; bei der Vordose von 0,30 mg/kg ist keiner-

lei Kumulierung festzustellen (Tabelle 7); oder wir finden hier die schon beim Digitoxin hervorgehobene Erscheinung in noch ausgesprochenerem Maße, daß nämlich die überlebenden Tiere sehr bald nahezu volle Zusatzdosen brauchen, so daß wir eigentlich in diesen Zusatzdosen kein Anzeichen erkennen können, daß überhaupt noch von der Vordose Glykosidreste im Herzen erhalten geblieben sind. Wollten wir aus diesen Zusatzdosen eine Kumulierungskurve analog der Kurve von Hatcher (Tabelle 1) konstruieren, dann kämen wir dabei in dieselbe Verlegenheit wie bei den Versuchen mit Digitoxin.

An einer wiederholt festgestellten Beobachtung können wir indessen nicht ganz vorbeigehen, das ist die Abnahme der Zusatzdosen nach etwa 3 Tagen. Ähnliche Beobachtungen sind auch schon früher von Hatcher u. Gold (16) sowie von van Esveld (15) gemacht worden, auch in der Arbeit von Fromherz u. Welsch (7) wurde darauf hingewiesen. Diese Befunde können deshalb nicht als rein zufällig angesehen werden. Um weitgehende Schlüsse aus ihnen zu ziehen, müßte allerdings noch ein wesentlich größeres Material zur Verfügung stehen. Ich muß aber auch hier wieder darauf hinweisen, daß diese Beobachtungen mit einer Glykoidspeicherung allein in keiner Weise erklärbar sind.

### C. Digalen.

In der Digitalistherapie verwendet man neben dem in Frankreich bevorzugten reinen Digitoxin (Digitalin-Nativelle) und dem besonders in Deutschland verbreiteten Gitalin-Kraft, das auch in Holland (als „Digi-sol“) gebraucht wird, weit überwiegend Präparate und Zubereitungen, die die Gesamtheit der in den Digitalisblättern enthaltenen Glykoside, oder doch wenigstens Bestandteile aller Glykosidfraktionen enthalten. Auch für die Digitalisinfuse ist das anzunehmen. Das pharmakologische Verhalten solcher Präparate und Zubereitungen muß also zwischen dem des Digitoxins und dem des Gitalins liegen. Ich habe als Beispiel für ein solches in der Therapie übliches Gesamtpräparat das Digalen der Firma Hoffmann-La Roche untersucht. Hoekstra (14) gibt an, daß dieses Präparat überhaupt nicht kumuliere. Schon auf Grund unserer bisherigen Befunde müssen wir aber diese Angabe als recht unwahrscheinlich bezeichnen.

Zu meinen Versuchen diente eine Digalensubstanz (Darstellung 1932), die etwas stärker war als die von Fromherz u. Welsch (7) benutzte (s. Tabelle 10).

Diese Substanz habe ich in derselben Weise zu Kumulierungsversuchen verwendet wie Digitoxin und Gitalin-Kraft. Auch hier habe ich

Tabelle 10. Wertbestimmung der Digalensubstanz an der Katze nach Magnus-de Lind van Wijngaarden.

| Katze<br>Nr. | Gewicht<br>in g | Infusionsdauer<br>in Minuten | Dosis letalis |          |
|--------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
|              |                 |                              | in mg         | in mg/kg |
| 1            | 3510            | 50                           | 3,652         | 1,040    |
| 2            | 3610            | 53                           | 3,980         | 1,102    |
| 3            | 2080            | 46                           | 2,080         | 1,000    |
| 4            | 3420            | 50                           | 3,178         | 0,931    |
| 5            | 2400            | 43                           | 2,488         | 1,033    |
| Mittel:      |                 |                              |               | 1,021    |

Versuche mit mehreren verschiedenen Vordosen angestellt. Eine Versuchsreihe mit Vordosen von 0,45 mg Digalensubstanz pro Kilogramm oder 45% der nach der nach Magnus-de Lind van Wijngaarden letalen Dose ergab wenige Spontanodesfälle, aber doch deutliche Zeichen von Kumulationserscheinungen:

Tabelle 11. Kumulierungsversuche nach Hatcher mit Vordosen von 0,45 mg Digalensubstanz pro Kilogramm.

| Katze<br>Nr. | Gewichte bei der    |                      | Beendigung der<br>Versuche<br>nach Zeit | Zusatzdosis g-Strophanthin |                           |
|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|              | I. Infusion<br>in g | II. Infusion<br>in g |                                         | in mg<br>pro Kilogramm     | in %<br>der Dosis letalis |
| 1            | 2270                | 2160                 | 24 Stunden                              | 0,0648                     | 67                        |
| 2            | 3880                | 3670                 |                                         | 0,0757                     | 78                        |
| 3            | 1770                | 1620                 |                                         | 0,0852                     | 89                        |
| 4            | 1630                | 1500                 |                                         | 0,1113                     | 115                       |
| 5            | 2710                | 2520                 |                                         | 0,0948                     | 98                        |
| Mittel:      |                     |                      |                                         | 0,0863                     | 90                        |
| 6            | 1610                | —                    | 36 Stunden                              | ohne Zusatzdosis gestorben |                           |
| 7            | 2540                | 2320                 | 48 Stunden                              | 0,0982                     | 102                       |
| 8            | 2120                | 1820                 |                                         | 0,1012                     | 105                       |
| 9            | 3440                | 3050                 |                                         | 0,0547                     | 56                        |
| 10           | 1630                | 1500                 |                                         | 0,1166                     | 120                       |
| 11           | 2870                | 2700                 |                                         | 0,0748                     | 77                        |
| 12           | 2830                | 2460                 |                                         | 0,0735                     | 76                        |
| 13           | 2630                | 2380                 |                                         | 0,0722                     | 75                        |
| Mittel:      |                     |                      |                                         | 0,0844                     | 88                        |

Daß hier eine gewisse Kumulierung vorliegt, wird besonders dann deutlich, wenn wir mit der entsprechenden Reihe der Versuche Gitalin-Kraft vergleichen und die einzelnen auffallend niederen Vordosen nach 48 Stunden betrachten.

Tabelle 12.  
Kumulierungsversuche nach Hatcher mit Vordosen  
von 0,60 mg Digalensubstanz pro Kilogramm.

| Katze<br>Nr. | Katzen<br>Gewicht in g bei der |              | Beendigung<br>der Versuche<br>nach Zeit | Zusatzdosis g-Strophanthin      |                           |
|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|              | I. Infusion                    | II. Infusion |                                         | in mg pro<br>Kilogramm          | in % der<br>Dosis letalis |
| 1            | 2350                           | —            | 10 Minuten                              | } ohne Zusatzdosen<br>gestorben |                           |
| 2            | 2510                           | —            | 25 „                                    |                                 |                           |
| 3            | 2610                           | —            | 90 „                                    |                                 |                           |
| 4            | 2300                           | —            | 24 Stunden                              |                                 |                           |
| 5            | 2030                           | 1940         | } 24 Stunden }                          | 0,8041                          | 88                        |
| 6            | 1930                           | 1750         |                                         | 0,0668                          | 69                        |
| 7            | 3030                           | 2730         |                                         | 0,0509                          | 52                        |
| 8            | 2940                           | 2740         |                                         | 0,0954                          | 98                        |
| 9            | 2880                           | 2640         |                                         | 0,0704                          | 73                        |
| 10           | 2170                           | 1950         |                                         | 0,1169                          | 120                       |
| Mittel:      |                                |              |                                         | 0,0807                          | 84%                       |
| 11           | 2280                           | —            | 48 Stunden                              | ohne Zusatzdosis<br>gestorben   |                           |
| 12           | 1810                           | 1590         | } 48 Stunden }                          | 0,1084                          | 112                       |
| 13           | 1810                           | 1590         |                                         | 0,0861                          | 90                        |
| 14           | 1910                           | 1700         |                                         | 0,1000                          | 104                       |
| 15           | 2520                           | 2200         |                                         | 0,0522                          | 54                        |
| 16           | 1920                           | 1600         |                                         | 0,0750                          | 78                        |
| Mittel:      |                                |              |                                         | 0,0843                          | 88%                       |
| 17           | 3060                           | —            | 60 Stunden                              | ohne Zusatzdosen<br>gestorben   |                           |
| 18           | 2360                           | 2150         | 72 Stunden                              | 0,0632                          | 66                        |
| 19           | 2690                           | 2340         | } 8 Tagen }                             | 0,0777                          | 80                        |
| 20           | 3370                           | 2850         |                                         | 0,0748                          | 77                        |
| 21           | 3030                           | 2380         |                                         | 0,0659                          | 68                        |
| 22           | 1870                           | 1640         |                                         | 0,1135                          | 117                       |
| 23           | 3300                           | 2800         |                                         | 0,1071                          | 111                       |
| Mittel:      |                                |              |                                         | 0,0878                          | 90%                       |
| 24           | 2930                           | 2400         | } 14 Tagen }                            | 0,0700                          | 73                        |
| 25           | 3270                           | 2700         |                                         | 0,0926                          | 96                        |
| 26           | 2970                           | 2580         |                                         | 0,0915                          | 95                        |
| 27           | 1900                           | 1810         |                                         | 0,1160                          | 120                       |
| 28           | 3950                           | 3600         |                                         | 0,1069                          | 110                       |
| 29           | 2630                           | 2050         |                                         | 0,0790                          | 82                        |
| Mittel:      |                                |              |                                         | 0,0927                          | 96%                       |

Tabelle 13. Kumulierungsversuche nach Hatcher mit Vordosen von 0,70 mg Digalensubstanz pro Kilogramm.

| Katze<br>Nr.                                                         | Katzen<br>Gewicht in g bei der |              | Beendigung<br>der Versuche<br>nach Zeit | Zusatzdosis g-Strophanthin      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                      | I. Infusion                    | II. Infusion |                                         | in mg pro<br>Kilogramm          | in % der<br>Dosis letalis |
| 1                                                                    | 2260                           | —            | 2 Minuten                               | } ohne Zusatzdosen<br>gestorben |                           |
| 2                                                                    | 2050                           | —            | 22 „                                    |                                 |                           |
| 3                                                                    | 3780                           | —            | 2 Stunden                               |                                 |                           |
| 4                                                                    | 3820                           | —            | 3 „                                     |                                 |                           |
| 5                                                                    | 2310                           | —            | 3 „                                     |                                 |                           |
| 6                                                                    | 2430                           | —            | 4 „                                     |                                 |                           |
| 7                                                                    | 2540                           | —            | 23 „                                    |                                 |                           |
| 8                                                                    | 2710                           | 2480         | } 24 Stunden }                          | 0,0580                          | 60                        |
| 9                                                                    | 2430                           | 2250         |                                         | 0,0422                          | 44                        |
| 10                                                                   | 2000                           | 1750         |                                         | 0,0765                          | 79                        |
| 11                                                                   | 2050                           | 1910         |                                         | 0,0937                          | 97                        |
| 12                                                                   | 1880                           | 1700         |                                         | 0,0547                          | 56                        |
| 13                                                                   | 3020                           | 2700         |                                         | 0,0977                          | 101                       |
| 14                                                                   | 2740                           | 2470         |                                         | 0,0417                          | 43                        |
| Mittel:                                                              |                                |              |                                         | 0,0663                          | 69%                       |
| 15                                                                   | 2310                           | —            | 30 Stunden                              | } ohne Zusatzdosen<br>gestorben |                           |
| 16                                                                   | 2310                           | —            | 40 „                                    |                                 |                           |
| 17                                                                   | 2440                           | —            | 44 „                                    |                                 |                           |
| 18                                                                   | 3670                           | 3380         | } 48 Stunden }                          | 0,0520                          | 54                        |
| 19                                                                   | 2100                           | 1950         |                                         | 0,0789                          | 81                        |
| 20                                                                   | 2620                           | 2440         |                                         | 0,0475                          | 49                        |
| 21                                                                   | 3780                           | 3480         |                                         | 0,0704                          | 73                        |
| 22                                                                   | 2810                           | 2520         |                                         | 0,0895                          | 93                        |
| Mittel:                                                              |                                |              |                                         | 0,0676                          | 70%                       |
| 23                                                                   | 2000                           | 1740         | } 72 Stunden }                          | 0,0419                          | 43                        |
| 24                                                                   | 2470                           | 2100         |                                         | 0,0557                          | 57                        |
| Mittel:                                                              |                                |              |                                         | 0,0488                          | 50%                       |
| 25                                                                   | 2450                           | —            | 5 Tagen                                 | } ohne Zusatzdosis<br>gestorben |                           |
| 26                                                                   | 3380                           | —            | 8 „                                     |                                 |                           |
| 27                                                                   | 2440                           | 2050         | } 8 Tagen }                             | 0,0844                          | 88                        |
| 28                                                                   | 2770                           | 2330         |                                         | 0,0493                          | 51                        |
| 29                                                                   | 2620                           | 2100         |                                         | 0,1300                          | 134                       |
| Mittel:                                                              |                                |              |                                         | 0,0879                          | 91%                       |
| 30                                                                   | 2210                           | —            | 9 Tagen                                 | ohne Zusatzdosis gestorben      |                           |
| 31                                                                   | 2060                           | 2150         | } 14 Tagen }                            | 0,1130                          | 117                       |
| 32                                                                   | 1840                           | 1660         |                                         | 0,1105                          | 114                       |
| 33                                                                   | 3380                           | 2710         |                                         | 0,0907                          | 94                        |
| 34                                                                   | 2000                           | 1900         |                                         | 0,0974                          | 101                       |
| Mittel:                                                              |                                |              |                                         | 0,1029                          | 106%                      |
| Anhang: gleiche Versuche mit 0,80 mg/kg Vor-<br>dosis: nach 14 Tagen |                                |              | 1.                                      | 0,1122                          | 117                       |
|                                                                      |                                |              | 2.                                      | 0,0805                          | 84                        |
| Mittel:                                                              |                                |              |                                         | 0,0964                          | 100%                      |

Suchen wir einen Überblick über die Versuche mit höheren Vordosen zu gewinnen, dann interessieren zunächst die Spontan Todesfälle, da diese

für die Höhe der Vordosen maßgebend waren, die zu den Kumulierungsversuchen verwendet werden konnten. Ich stelle diese deshalb nochmals tabellarisch zusammen, wobei ich, um einen besseren Vergleich zu ermöglichen, die Dosen untereinander schreibe, die sich in ihrem Verhältnis zu den nach der Infusionsmethode von Magnus-de Lind van Wijngaarden tödlichen Dosen entsprechen:

Tabelle 14.

| % der nach Magnus letalen Dose . . . . .                 | 25 | 35 | 45 | 50  | 60 | 70 | 80 |
|----------------------------------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|
| Mortalität ohne Zusatzdosen in % der injizierten Katzen: |    |    |    |     |    |    |    |
| I. Digitoxin . . . . .                                   | 6  | 54 | 80 | 100 |    |    |    |
| II. Gitalin-Kraft . . . . .                              |    | 10 |    |     |    | 29 | 39 |
| III. Digalensubstanz . . . . .                           |    |    | 10 |     | 27 | 60 |    |

In dieser Tabelle sind die Zahlen der prozentualen Mortalität der Digalensubstanz ohne Zusatzdose aus den Tabellen 11 und 12 in analoger Weise berechnet wie für Gitalin in den Tabellen 8a und 9a. Wir finden damit die Spättodesfälle bei der Digalensubstanz deutlich häufiger als bei Gitalin. Der Unterschied zwischen diesen beiden Substanzen ist aber geringer als zwischen Gitalin und Digalen einerseits, Digitoxin andererseits. Es ist auch ersichtlich, daß wir von beiden Substanzen im Verhältnis zu den zeitgebunden letalen Dosen weit höhere Vordosen zu den Kumulierungsversuchen verwenden konnten als bei Digitoxin.

Betrachten wir die Höhe der Zusatzdosen um die Stärke der Kumulierung zu beurteilen, dann finden wir vor allem bei den Versuchen mit den höchsten Vordosen (Tabelle 9 und 12) in den ersten Tagen die Zusatzdosen nach Digalen merklich geringer als nach Gitalin, als Zeichen stärkerer Kumulierung. Bei niederen Vordosen ist nach beiden Präparaten keine oder nur eine recht geringe Kumulierung festzustellen. Nach 14 Tagen wurden immer volle Zusatzdosen benötigt. Nach 8 Tagen dagegen findet man immer wieder einzelne Tiere, die nach auffallend niederen Zusatzdosen sterben und den Durchschnitt drücken. Auch hier müssen wir wieder feststellen, daß wir zwischen beiden Substanzen und Digitoxin keine prinzipiellen Unterschiede haben: Bei entsprechender Wahl der Dosen erhalten wir mit allen drei Präparaten dasselbe Bild der „Auffüllversuche“.

Der wesentliche Unterschied zwischen den untersuchten Glykosiden bleibt der Abstand der zeitgebunden, bei der Infusion in einem Zug letalen Dose von der zeitlos tödlichen. Der Unterschied zwischen Digitoxin und

Gitalin läge also wohl mehr darin, daß die volle Entwicklung der Digitoxinwirkung mehr Zeit beansprucht als die volle Entwicklung der Gitalinwirkung.

Die ganzen Versuche leiden an dem Mangel, daß sie uns Bruttoresultate von Verteilung, Schicksalen und Wirkungen der Glykoside liefern, deren Teile wir nicht übersehen können. Man könnte daran denken, durch eine andere Dosenberechnung bessere Ergebnisse zu erzielen. Durch Berechnung der Zusatzdosen auf das Anfangsgewicht würden diese durchweg 10—13% niedriger, durch Berechnung auf ein mittleres Gewicht 5—7% niedriger. Ein grundsätzlich anderes Ergebnis aber würde damit nicht erhalten werden. Auch wenn man auf das Herzgewicht berechnen würde, würde wohl kaum eine klarere Gesetzmäßigkeit in Erscheinung treten; denn wie Weese gezeigt hat, werden 85% alles infundierten Glykosids extrakardial gebunden. Sollten solche Auffüllversuche wiederholt werden, dann würde es sich empfehlen, auch das Herzgewicht zu berücksichtigen. Wir glauben aber nicht, daß man mit irgendeiner derartigen Modifikation der Berechnung noch zu einem Fortschritt in der Erklärung der Kumulationserscheinungen gelangen kann. Ein Fortschritt wird überhaupt nicht durch alleinige Beobachtung der Summe aller Vorgänge sondern nur durch das Studium der einzelnen Teilwirkungen und Schicksale der Glykoside zu erreichen sein.

### Zusammenfassung.

1. Die Kumulierungskurve des Digitoxins, wie sie sich aus den Angaben von Hatcher ergibt, entspricht innerhalb der Fehlergrenze der Methode dem Verlauf einer monomolekularen Reaktion. Gegen die Wahrscheinlichkeit eines solchen Verlaufs, besonders die lange Dauer, lassen sich aber vom biochemischen Standpunkt schwerwiegende Bedenken erheben.

2. Die tödliche Grenzdose des reinen kristallisierten Digitoxins für die Katze ist von der Beobachtungszeit abhängig:

0,40 mg/kg ist bei der Infusion nach Magnus (in einem Zug innerhalb von 30—45 Minuten) letal.

0,247 mg/kg ist nach der Methode von Hatcher und Brody (Auffüllen mit g-Strophanthin nach 20 Minuten Pause) letal.

0,20 mg/kg tötet innerhalb von 24 Stunden die Hälfte, innerhalb von 14 Tagen alle injizierten Katzen.

0,17 mg/kg ist innerhalb von 14 Tagen für 80% der Katzen letal.

0,14 mg/kg ist innerhalb von 14 Tagen für 50% der Katzen letal.

0,10 mg/kg wird von der überwiegenden Mehrzahl der Katzen bei zeitloser Beobachtung ertragen.

Dementsprechend sterben bei Auffüllversuchen nach Hatcher nach Dosen Digitoxin, die von der letalen nicht sehr entfernt sind, so viele Katzen ohne Zusatzdosen, daß es nicht statthaft erscheint, diese Fälle für die Frage der Kumulierung aus der Betrachtung auszuschneiden. Diese Spontanodesfälle zeigen aber, daß sich noch Tage nach einer Infusion von Digitoxin im Herzen Vergiftungsvorgänge oder deren Folgen abspielen müssen, die durch die Speicherung des Glykosids allein nicht erklärbar sind.

3. Sieht man bei Auffüllversuchen nach Hatcher an Katzen von diesen Spontanodesfällen ab, dann findet man so große Streuungen der Zusatzdosen, daß es kaum statthaft erscheint, sie zu Mittelwerten zusammenzufassen. Eher weisen die Zahlen darauf hin, daß es sich um zwei Gruppen von Tieren handelt, von denen die einen das Glykosid rasch eliminiert haben und volle Zusatzdosen brauchen, während die anderen schwer geschädigt sind und nach Zusatzdose Null oder Spontanod konvergieren.

4. Allgemein, hauptsächlich aber nach kleinen Vordosen und über 8 Tage nach großen Vordosen Digitoxin, deuten die benötigten hohen Zusatzdosen auf ein wesentlich rascheres Verschwinden des Digitoxins aus dem Herzen, als es der Hatterschen Kumulierungskurve entsprechen würde.

5. Gibt man alle 2 Tage eine kleine Dose Digitoxin intravenös, dann sterben die Katzen nach der zweiten oder dritten Dose von 0,10 mg/kg, entsprechend einer reinen Addition der Einzeldosen. Alle 2 Tage 0,05 mg/kg wird aber sechsmal ohne Vergiftungserscheinungen ertragen, und die Katzen verbrauchen danach die volle Zusatzdose: Dosen Digitoxin unter einer gewissen Schwelle kumulieren also überhaupt nicht, werden also längstens innerhalb von 48 Stunden völlig eliminiert.

6. Alle diese Versuche führen zu dem Schluß, daß auch das Digitoxin bei weitem nicht so lange im Herzen gespeichert werden kann als es der Kumulierungskurve von Hatcher entsprechen würde. Wir müssen daraus folgern, daß die Kumulierungserscheinungen nicht auf einer Speicherung der Substanz beruhen, sondern, daß es sich um reine Summation von Wirkungen handelt. Indem wir damit die Speicherungstheorie fallen lassen, müssen wir annehmen, daß das Digitoxin im Herzen primäre und wohl auch sekundäre, zunächst nur funktionelle, dann aber möglicherweise auch morphologische Schädigungen im Herzmuskel verursacht, die der Kumulierung zugrunde liegen.

7. Um dafür weitere Anhaltspunkte zu gewinnen, wurden während eines größeren Teils der beschriebenen Versuche Elektrokardiogramme aufgenommen. Es zeigte sich, daß im wesentlichen bei schweren Veränderungen des EKG, besonders negativer T-Zacke, auch niedere Zusatzdosen benötigt werden. Diese Versuche werden fortgesetzt, und es wird darüber in neuem Zusammenhang in einer II. Mitteilung berichtet.

8. Die analogen Versuche wurden mit Gitalin-Kraft ausgeführt. Es zeigt sich vor allem, daß die letale Dose dieser Glykosidfraktion bei zeitloser Beobachtung der letalen Dose bei der Infusion nach Magnus wesentlich näher liegt als wir es bei Digitoxin gefunden haben. Wir müssen das als den wesentlichsten Unterschied in der Wirkung dieser Glykoside betrachten. Bei Auffüllversuchen nach Hatcher ist es dementsprechend möglich, im Verhältnis zu der bei der Infusion letalen Dose wesentlich höhere Dosen als Vordosen zu gebrauchen. Mit solchen Dosen Gitalin-Kraft erhält man dann aber ein sehr ähnliches Bild des Verlaufs der Auffüllversuche wie bei Digitoxin.

9. Das Digalen der Firma Hoffmann-La Roche enthält den größten Teil der wirksamen Bestandteile der Blätter von *Digitalis purpurea*. Dementsprechend steht es in seinem Verhalten zwischen dem Digitoxin und dem Gitalin-Kraft, dem letzteren allerdings wesentlich näher. Seine kumulierende Wirkung ist deutlich stärker als die des Gitalin-Kraft, aber weit geringer als die des Digitoxins.

### Anhang.

#### Bemerkungen über die Auswahl und Pflege der Katzen bei Kumulierungsversuchen.

Für Versuche mit Digitalisglykosiden sollen Katzen einigermaßen ausgewachsen, aber auch nicht zu alt sein. Vor allem geben alte fette Kater, wie auch Hatcher beobachtete, schlechte Resultate. Die Gewichtsgrenzen von 1700—3000 g sollten nicht wesentlich überschritten werden. Es genügt nicht, sich aus dem allgemeinen Aussehen (glattes Fell, Konjunctivitis usw.) ein Bild von dem Gesundheitszustand einer Katze zu machen, die man zu einem Versuche verwenden will; es empfiehlt sich, Herz und Lunge vorher auskultatorisch zu untersuchen. Verschärftes Bronchialatmen oder Rasselgeräusche über der Lunge sollten immer veranlassen, ein Tier von einem Versuche auszuschalten. Nicht selten beobachtet man auch Herzgeräusche, aus denen zu schließen ist, daß ein Tier kein verwertbares Resultat liefern kann. Eine schon äußerlich erkennbare Gravidität schließt einen brauchbaren Versuch aus. Eine Gravidität in früheren Stadien wird bei der Sektion festgestellt und zwingt zur Streichung eines Versuchs. Wegen der Brunstzeit sind besonders die Monate Februar und März für Versuche an Katzen wenig geeignet.

Besonders in gewissen Jahreszeiten kommen bei Katzen Infektionen vor, die äußerlich nicht wahrnehmbar sind, aber abnorme Resultate bedingen und

erst durch die Sektion und die histologische Untersuchung aufgeklärt werden können. Nachdem Weese und Weilguny beobachtet haben, daß fiebernde Katzen gegen Digitalis abnorm resistent sind, sollten die Tiere vor dem Versuch auch gemessen werden. Im Herbst hatte ich einen großen Ausfall an Versuchen durch Pneumonien, wozu Katzen bisweilen disponiert sind. Ferner beobachteten wir im Herbst eine parasitäre Wurminfektion der Lungen, die Herr Prof. Büchner vom hiesigen pathologischen Institut in zahlreichen Fällen anatomisch nachgewiesen hat. Obwohl die Tiere äußerlich keinen kranken Eindruck machten, reagierten sie in den Versuchen ausgesprochen abnorm: alle diese Versuche mußten gestrichen werden. Von Dezember 1932 an hatte ich dann wieder weit überwiegend gesunde und gleichmäßig reagierende Tiere. Es ist also besonders in den naßkalten Herbstmonaten eine sorgfältige, kritische, auch anatomische Wertung jedes Versuches nötig, wenn man einwandfreie Ergebnisse erzielen will.

Es ist eine bekannte Tatsache, daß man mit frisch eingelieferten Tieren oft ganz andere Resultate erhält als mit Tieren, die längere Zeit im Stall gehalten wurden. Mir selbst war das auch aus Erfahrungen am Herz-Lungenpräparat geläufig. Ein großer Teil der Katzen, die man frisch herein bekommt, verweigert zunächst in der neuen Umgebung die Nahrung. Daß in dieser Weise nicht angepaßte oder geschwächte Tiere sich zu Versuchen schlecht eignen, besonders im Versuch einen starken Gewichtssturz zeigen, leuchtet ein. Nach einigen Tagen haben sich die meisten Katzen angepaßt, fressen, sind zutraulicher geworden, und man arbeitet mit ihnen unter normalen Bedingungen.

Jede Katze braucht Auslauf. Tiere, die längere Zeit in engen Ställen oder gar in Stoffwechseltrichtern gehalten werden, leiden unter diesen Bedingungen sehr und nehmen oft selbst ohne Versuch rapide an Gewicht ab. Das vorgesetzte Futter wird kaum beachtet. Die Katze braucht also eine sorgfältige, man möchte sagen, eine individuelle Pflege, wenn sie in gutem Zustand in den Versuch kommen und den Versuch ohne Störungen überstehen soll. Besonders wichtig ist diese Pflege auch während des Versuchs: Im Beginn meiner Arbeit habe ich die Tiere zur Beobachtung nach der Vordose noch 1—2 Tage im Käfig gehalten. Sie lagen dann auch nach relativ kleinen Dosen zusammengekauert oder in Seitenlage in einer Ecke und machten einen elenden Eindruck. Sie speichelten und verweigerten jede Nahrung. Später brachte ich die Tiere nach den gleichen Dosen sofort in den großen Stall, wo sie in der Regel schon nach wenigen Tagen wieder fraßen, ihr normales Interesse für Umgebung und Reinlichkeit und ihr normales Verhalten wieder aufnahmen. Es ist einleuchtend, daß solche Tiere bei Auffüllversuchen einwandfreiere Ergebnisse liefern als die im Käfig gehaltenen hungernden und elenden. Wiederholt konnte ich feststellen, daß Tiere nach der Vordose im großen Stall mit Auslauf nicht speichelten, daß aber der Speichelfluß und der matte und kranke Allgemeinzustand alsbald wieder einsetzte, sowie sie in den engen Käfig gebracht wurden. Nach großen Dosen von Digitalisglykosiden allerdings erweisen sich die Tiere auch im Stall mit Auslauf sehr mitgenommen und verweigern das Fressen aus einem großen allgemeinen Geschirr. Solche Tiere erholen sich oft erstaunlich gut, wenn man sie in einen geräumigen Käfig mit weichem Lager bringt und ihnen einzelne Stückchen gekochtes Fleisch oder Leber, oder geräucherten Fisch vorsetzt. Milch beachten die Tiere in diesem angegriffenen Zustand meistens nicht.

## Literatur.

1. Straub, W.: Biochem. Z. **28**, 392 (1910). Dtsch. med. Wschr. Jg. 48, 791 (1922).
- 2. Fischer, H.: Arch. f. exper. Path. **130**, 111, 194 (1928). — 3. Ebenda **135**, 39. —
4. Weese: Ebenda **141**, 329 (1929). Dtsch. med. Wschr. **1931**, 625. — 5. Hatcher: Arch. int. Med. **10**, 268 (1910). Hatcher u. Brody: Amer. J. Pharmacy **82**, 360 (1910).
- 6. Fischer, H.: Arch. f. exper. Path. **130**, 111f. (1928). — 7. Fromherz, K. u. A. Welsch: Arch. f. exper. Path. **161**, 266 (1931). — 8. Gold: Arch. int. Med. **32**, 779 (1923). — 9. Planelles u. Werner: Arch. f. exper. Path. **96**, 21 (1922). — 10. Brams: Arch. int. Med. **43**, 676 (1929). — 11. Weese u. Weilguny: Arch. f. exper. Path. **167**, 89 (1932). — 12. Fränkel: Ebenda **51**, 84 (1904). — 13. Baumann: Klin. Wschr. Jg. 1932, S. 1309. — 14. Hoekstra: Arch. f. exper. Path. **162**, 649; **163**, 366 (1931). — 15. van Esveld: Ebenda **160**, 375 (1931). — 16. Hatcher u. Gold: J. amer. pharmaceut. Assoc. **18**, 551 u. 670 (1929).

Die Anregung zu der vorstehenden Arbeit verdanke ich Herrn Prof. Fromherz, dessen Kritik mich auch im Laufe meiner Versuche wesentlich förderte. Herr Prof. Janssen überließ mir in entgegenkommender Weise für meine Versuche die Arbeitsmöglichkeiten seines Instituts. Die elektrokardiographischen Aufnahmen wurden in der Med. Klinik mit Unterstützung von Herrn Privatdozent Dr. Baumann ausgeführt. Für die pathologisch-anatomischen Fragen erfreute ich mich der Beratung durch Herrn Prof. Büchner. Die Kosten der Versuche wurden mit Mitteln bestritten, die die Firma F. Hoffmann-La Roche freundlichster Weise zur Verfügung stellte. Allen diesen Herren spreche ich auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aus.

---



## Lebenslauf.

Am 27. Juli 1899 wurde ich in Lahr in Baden geboren. Nach Besuch der Vorschule und Oberrealschule in Freiburg i. Br. legte ich 1917 an der Oberrealschule in Freiburg i. Br. die Reifeprüfung ab. Zuerst widmete ich mich dem Studium der Chemie in Freiburg und promovierte dort zum Dr. phil. nat. Ich studierte dann Medizin an den Universitäten zu Freiburg, Köln, Bonn und Freiburg. Die ärztliche Vorprüfung legte ich im Wintersemester 1931 in Bonn ab.

Freiburg i. Br., im Juni 1933.

Hellmut Bauer.